BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian diare pada bayi usia 7-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sawan 1 Kabupaten Buleleng tahun 2024 dengan 83 responden dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, didapatkan sebagian besar adalah perguruan tinggi sebanyak 47 responden (56,6%). Karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan sebagian besar bekerja dengan jumlah 49 responden (59.0%).
- 2. Hasil penelitian pemberian ASI Eksklusif di wilayah Kerja Puskesmas Sawan I Tidak ASI Eksklusif sebanyak 52 responden (62,7%), ASI Eksklusif sebanyak 31 responden (37,3%).
- **3.** Bedasarkan hasil penelitian kejadian diare sebanyak 58 responden (69,9%), sedangkan yang tidak diare sebanyak 25 responden (30,1%)
- **4.** Hasil analisis data menggunakan uji Chi- Square diperoleh nilai asymp.sig (2-sided) sebesar 0.000. Karena nilai asymp.sig (2-sided) 0,000< 0,05 Hal ini berarti adanya hubungan pendidikan terakhir dan status pekerjaan terhadap pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 7-12 bulan di wilayah kerja puskesmas sawan 1
- 5. Hasil analisis data menggunakan uji Chi- Square diperoleh nilai asymp.sig (2-sided) sebesar 0.000. Karena nilai asymp.sig (2-sided) 0,000< 0,05 Hal ini

berarti adanya hubungan pendidikan terakhir dan status pekerjaan terhadap kejadian diare pada bayi usia 7-12 bulan di wilayah kerja puskesmas sawan 1

6. Hasil analisis data menggunakan uji Chi- Square diperoleh nilai asymp.sig (2-sided) sebesar 0.000. Karena nilai asymp.sig (2-sided) 0,000< 0,05 Hal ini berarti adanya hubungan pemberian ASI Eksklusif terhadap kejadian diare pada bayi usia 7-12 bulan di wilayah kerja puskesmas sawan 1, sehingga pemberian ASI Eksklusif tidak menyebabkan terjadi diare pada bayi usia 7-12 bulan.

B. Saran

1. Bagi ibu bayi

Hasil penelitian ini di harapkan responden dapat memahami pentingnya pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, sehingga resiko kejadian diare pada bayi dapat berkurang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ini sebagai bahan masukkan dalam pengembangan penelitian berikutnya dengan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian diare.

3. Bagi tempat peneliti

Diharapkan dari penelitian ini, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai tambahan data bagi pihak puskesmas untuk dapat menyusun rencana tindak lanjut hasil temuan terkait pemberian ASI Eksklusif dan pengendalian penyakit diare.