


BAB III KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep

Keterangan :

: Diteliti

: Tidak diteliti

Salah satu metode kontrasepsi hormonal yaitu metode suntik DMPA (*Depo Medroksi Progesteron Asetat*) , penggunaan kontrasepsi suntik DMPA (*Depo Medroksi Progesteron Asetat*) terdiri dari penggunaan jangka panjang dan jangka pendek. Penggunaan kontrasepsi suntik dapat meningkatkan kadar kolesterol total, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kadar kolesterol total seperti, lama penggunaan. Untuk mengetahui kadar kolesterol total pada pengguna kontrasepsi suntik, maka dilakukan pemeriksaan kolesterol total menggunakan metode CHOD-PAP. Hasil pemeriksaan kolesterol total dikelompokkan berdasarkan kategori normal, ambang batas dan tinggi.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


a. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jangka waktu penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan.

b. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar kolesterol total akseptor yang menggunakan KB suntik 3 bulan.

2. Hubungan Antar Variabel



Gambar 2. Hubungan Antar Variabel

3. Definisi Operasional

Tabel 2

Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Ukur	Skala
1	2	3	5
Jangka waktu penggunaan KB suntik 3 bulan	Lama waktu wanita usia subur menggunakan Kontrasepsi suntik 3 bulan dari awal menggunakan Kontrasepsi suntik 3 bulan hingga penelitian ini dilakukan. Kategori lama penggunaan adalah sebagai berikut: Jangka pendek: < 2 tahun Jangka panjang: >2 tahun	Observasi kartu KB	Ordinal
Kadar kolesterol total	Kadar kolesterol total yang diukur dari pengguna Kontrasepsi suntik 3 bulan yang diambil dari darah vena. Hasil pengukuran kolesterol dapat dikategorikan sebagai berikut: Normal: >200 mg/dL Ambang Batas: 200-239 mg/dL Tinggi: >240 mg/dL Sumber : Perkeni, 2019.	Pemeriksaan menggunakan metode CHOD PAP.	Ordinal

C. Hipotesis

Terdapat hubungan jangka waktu penggunaan kontrasepsi suntik 3 bulan dengan kadar kolesterol total akseptor di Puskesmas Susut II Bangli.