

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan simpulan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli sebanyak (18,4%)
2. Mayoritas responden memiliki usia reproduktif ideal 20-35 tahun, kelompok responden multigravida jauh lebih banyak dibandingkan primigravida, sebagian besar responden tidak memiliki riwayat anemia pada saat hamil 38 (17,1%), sebagian besar tidak ada riwayat PE 38 (17,0%), sebagian besar tidak memiliki riwayat HDK 36 (18,3%), sebagian besar responden ada riwayat KPD 31 (22,5%) pada saat persalinan, sebagian besar responden mengalami riwayat partus lama 28 (30,8%), komplikasi ini cukup berpengaruh pada saat persalinan.
3. Faktor yang berhubungan dengan asfiksia di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli adalah PE dengan nilai ( $p : 0,038$ ) dan Partus Lama dengan nilai ( $p : 0,000$ ).

#### B. Saran

1. Manfaat teoritis

Untuk peneliti selanjutnya : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama yang berkaitan dengan fakto-faktor ibu yang berhubungan dengan resiko terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir dan sebaiknya menggunakan data perspektif primer

## 2. Manfaat Praktis

Untuk Rumah Sakit: Hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi bidan dan menyusun kebijakan program kesehatan ibu yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas maupun praktik mandiri tentang faktor-faktor penyebab kejadian Asfikisa pada bayi baru lahir dan diperlukannya peran aktif petugas kesehatan dalam memberikan edukasi pada ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilan aman agar kelahiran asfiksia dapat dicegah sehingga dampak morbiditas dan mortalitas bayi dapat menurun.