

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

Responden dalam asuhan kebidanan ini adalah Ibu “KK” umur 35 tahun multigravida beralamat di Jl. Pakuk Sari, Gg. 3D No. 4, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Ibu tinggal disebuah tempat kos bersama dengan suami dan terdapat beberapa tetangga di sebelah kanan dan kiri rumah ibu. Rumah ibu terdiri dari 1 kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi dan teras. Kondisi lingkungan tempat tinggal ibu dalam keadaan bersih. Ventilasi dan pencahayaan yang cukup menyebabkan ruangan menjadi tidak lembab.

Penulis pertama kali bertemu ibu “KK” di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan yang saat itu ibu melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas. Penulis melakukan pendekatan dengan ibu “KK” dan suaminya untuk memohon izin menjadikan ibu sebagai responden kasus laporan akhir. Ibu “KK” dan suaminya bersedia menjadi responden dan menandatangani form *informed consent* dilanjutkan dengan memberikan asuhan kebidanan secara *Continuity of Care*.

Asuhan kebidanan dilakukan melalui kunjungan rumah dan mendampingi ibu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, mendampingi selama proses bersalin, melakukan pemantauan masa nifas, neonatus, dan bayi hingga 42 hari di fasilitas kesehatan. Asuhan kebidanan kehamilan dari umur kehamilan 17 Minggu 6 Hari sampai 42 hari masa nifas diuraikan sebagai berikut.

**1. Penerapan asuhan kebidanan pada ibu “KK” dari umur kehamilan 17 minggu 6 hari sampai menjelang persalinan.**

Asuhan kebidanan kehamilan pada Ibu “KK” dilakukan melalui kunjungan antenatal di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan sebanyak 8 kali, dr. Sp.OG sebanyak 4 kali serta kunjungan rumah sebanyak 5 kali oleh penulis. Selama penulis memberikan asuhan, ibu melakukan *antenatal care* sebanyak 20 kali dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Penerapan Asuhan Kebidanan Kehamilan dan Komplementer pada Ibu “KK” Selama Kehamilan di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan dan Rumah Ibu “KK” Tahun 2025-2026**

Hari/Tanggal/ Waktu/Tempat	Catatan Perkembangan	Tanda Tangan/ Nama
1	2	3
Senin, 27 Oktober 2025 Pk. 14.30 WITA Kunjungan Rumah Ibu “KK”	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Gerakan janin sudah dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu sudah melakukan <i>brainbooster</i> dan stimulasi dengan mengajak janin berkomunikasi. Ibu tidak ada kesulitan bernafas. Ibu hari ini makan sebanyak 2 kali porsi sedang dengan menu nasi, tempe, ayam goreng, dan sayur. Ibu biasanya makan buah-buahan seperti buah mangga, pisang, dan buah naga. Hari ini ibu minum air mineral sebanyak 2 liter. Ibu istirahat siang dari pukul 11.00 WITA - 12.00 WITA. Ibu sudah minum suplemen teratur dan berhenti minum kopi. Ibu sangat bahagia dengan kehamilannya.  O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i> , tekanan darah: 110/70 mmHg, MAP: 83,3 mmHg, suhu: 36,5°C, nadi: 82x/menit, pernapasan: 20x/menit TFU: 2 jari bawah pusat, MCD: 20 cm	A.A. Istri Wulan

1	2	3
	<p>A: G3P2A0 UK 21 Minggu 3 Hari T/H Intrauterine Masalah Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan bahwa hasil pemeriksaan dalam batas normal, ibu paham.</p> <p>2. Memberikan KIE terkait:</p> <p>a. Mengingatkan ibu untuk melakukan stimulasi, ibu paham.</p> <p>b. Mengonsumsi makanan yang mengandung asam folat seperti sayur bayam, brokoli dan sawi; zat besi seperti hati ayam, buah bit; vitamin A seperti wortel, mangga, telur; vitamin B seperti pisang, kacang panjang; vitamin B12 seperti ikan, telur, ayam; vitamin C seperti jeruk, jambu; kalsium seperti susu; vitamin D seperti ikan dan telur; DHA seperti makanan hasil laut. Ibu paham dan bersedia mengonsumsi makanan tersebut.</p> <p>c. Minum air mineral yang cukup sebanyak 2 liter/hari dan mengurangi untuk minum teh karena dapat mengurangi penyerapan usus. Ibu paham dan bersedia minum air 2 liter/hari.</p> <p>d. Mengingatkan ibu untuk istirahat yang cukup dan harus selalu bahagia, ibu paham.</p> <p>3. Mengingatkan kembali ibu untuk minum suplemen dan kontrol kehamilan, ibu bersedia dan berencana kontrol kehamilan pada tanggal 03 November 2025 di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan sekitar pk. 09.00 WITA.</p>	
<p>Senin, 03 November 2025 Pk. 09.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar</p>	<p>S: Ibu menyampaikan keinginannya untuk memeriksakan kehamilan dan tidak mengeluhkan adanya masalah. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu sudah melakukan stimulasi dengan mengajak janin berkomunikasi. Ibu tidak ada kesulitan bernapas, Ibu makan terakhir pukul 08.00 WITA dengan menu nasi, ayam, telur dan sayur. Ibu</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
Selatan	<p>minum air mineral terakhir pukul 08.00 WITA sebanyak 2 gelas. Ibu bahagia. Ibu tidak ada masalah spiritual. Ibu bahagia. Ibu tidak ada masalah spiritual.</p> <p>O: Suplemen yang sebelumnya diberikan telah rutin dikonsumsi oleh ibu, namun kini sudah tidak tersisa. Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, BB: 68,3 kg, tekanan darah: 125/69 mmHg, MAP: 87,6 mmHg, suhu: 36,3°C, nadi: 80x/menit, pernapasan: 20x/menit, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab. TFU: sepusat, Mcd: 20 cm, TBBJ: 930 gram, DJJ: 152x/menit kuat dan teratur, ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merah muda, oedema (-/-), reflek patella (+/+).</p> <p>A: G3P2A0 UK 22 Minggu 3 Hari T/H Intrauterine Masalah Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa hasil dalam batas normal. Ibu merasa senang dan dapat menerima kondisinya.</p> <p>2. Memberikan KIE terkait: Hal-hal yang harus dihindari ibu selama hamil seperti minum obat tanpa resep dan stress berlebihan, ibu paham</p> <p>a. Memberikan informasi terkait perubahan fisik dan psikologi dalam masa kehamilan, ibu paham.</p> <p>b. Mengingatkan kembali terkait tanda bahaya trimester kedua. Ibu dapat menyebutkan tanda bahaya seperti pusing, perdarahan, demam, gerakan janin berkurang, dan nyeri perut hebat.</p> <p>3. Memberikan ibu terapi suplemen: SF 2 x 60 mg (XXX) Kalsium 1 x 500 mg (XXX) mengingatkan ibu untuk meminum</p>	

1	2	3
	<p>suplemen kehamilan secara teratur sesuai aturan yang diberikan serta mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan mangga yang dapat mempercepat penyerapan zat besi dan kalsium, ibu bersedia.</p> <p>Memberitahukan ibu untuk melakukan kontrol kehamilan pada tanggal 03 Desember 2025 atau apabila ada keluhan, ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</p> <p>c. Memberikan informasi terkait perubahan fisik dan psikologi dalam masa kehamilan, ibu paham.</p> <p>d. Mengingatkan kembali terkait tanda bahaya trimester kedua. Ibu dapat menyebutkan tanda bahaya seperti pusing, perdarahan, demam, gerakan janin berkurang, dan nyeri perut hebat.</p> <p>4. Memberikan ibu terapi suplemen: SF 2 x 60 mg (XXX) Kalsium 1 x 500 mg (XXX) mengingatkan ibu untuk meminum suplemen kehamilan secara teratur sesuai aturan yang diberikan serta mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan mangga yang dapat mempercepat penyerapan zat besi dan kalsium, ibu bersedia.</p> <p>Memberitahukan ibu untuk melakukan kontrol kehamilan pada tanggal 03 Desember 2025 atau apabila ada keluhan, ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</p>	
<p>Senin, 10 November 2025 Pk. 19.00 WITA dr. I.G.A.A.R. Wulandari,</p>	<p>S: Ibu ingin melakukan pemeriksaan kehamilan dan tidak ada keluhan.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran <i>composmentis</i>, BB: 69 kg, tekanan darah: 110/76 mmHg. Pemeriksaan USG: Janin T/H, EFW 678 gram, BPD 6,1 cm, HC 22,16 cm, AC 19,07 cm, FL 4,4 cm, GA 24w</p>	<p>dr. I.G.A.A.R. Wulandari, SpOG</p>

1	2	3
SpOG	<p>EDD 02-03-2026</p> <p>G3P2A0 UK 24 minggu T/H <i>Intrauterine</i></p> <p>A: Masalah: Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan bahwa dalam batas normal, ibu paham.</p> <p>2. Memberikan KIE terkait nutrisi dan pola istirahat, ibu paham.</p> <p>3. Memberikan ibu terapi suplemen: Asam folat 1 x 400 mcg (XXX) dan melanjutkan vitamin yang diberikan di puskesmas dan diminum secara teratur. Ibu paham.</p>	
<p>Rabu, 03 Desember 2025, Pk. 08.30 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu mengatakan ingin melakukan pemeriksaan kehamilan. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu tidak ada kesulitan bernafas, Ibu makan terakhir pukul 07.00 WITA porsi sedang dengan menu nasi, telur dan sayur sup. Pada pagi hari ini, ibu minum air mineral sebanyak 2 gelas. Kemarin, ibu tidur malam pukul 22.00 WITA - 06.00 WITA. Suasana hati ibu baik. Ibu tidak ada masalah spiritual. Suplemen ibu habis.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran <i>composmentis</i>, BB: 72,3 kg, tekanan darah: 127/71 mmHg, MAP: 89,6 mmHg, suhu: 36,4°C, nadi: 79x/menit, pernapasan: 21x/menit, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab. TFU: 1 jari di atas pusat, Mcd: 25 cm, TBBJ: 2.015 gram, DJJ: 152x/menit kuat dan teratur, ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merah muda, oedema (-/-), reflek pattela (+/+).</p> <p>A: G3P2A0 UK 26 Minggu 5 Hari T/H <i>Intrauterine</i> Masalah: Tidak ada masalah</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa hasil dalam batas normal. Ibu merasa</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>senang dan menerima kondisinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan KIE terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengingat kembali terkait tanda bahaya trimester kedua. Ibu dapat menyebutkan tanda bahaya seperti pusing, perdarahan, demam, gerakan janin berkurang, dan nyeri perut hebat</li> <li>b. Mengingat ibu untuk menjaga pola istirahat dan nutrisi</li> </ol> </li> <li>3. Memberikan ibu terapi suplemen:</li> <li>4. SF 2 x 60 mg (XXX) Kalsium 1 x 500 mg (XXX) dan mengingatkan ibu untuk meminum suplemen kehamilan secara teratur sesuai aturan yang diberikan serta mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan mangga yang dapat mempercepat penyerapan zat besi dan kalsium, ibu bersedia.</li> <li>5. Memberitahukan ibu untuk melakukan kontrol kehamilan pada tanggal 05 Januari 2026 atau apabila ada keluhan, ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</li> </ol>	
<p>Senin, 05 Januari 2026, Pk. 09.30 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu mengatakan ingin melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan laboratorium, serta mengeluh adanya nyeri punggung. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu tidak ada kesulitan bernafas, Ibu makan terakhir pukul 08.30 WITA porsi sedang dengan menu nasi, ayam, dan sayur sup. Pada pagi hari ini, ibu minum air mineral 2 gelas. Kemarin, ibu tidur malam pukul 22.30 WITA - 06.00 WITA. Suasana hati ibu baik. Ibu tidak ada masalah spiritual. Ibu sudah rutin mengonsumsi suplemen dan suplemen.USG (04 Januari 2026) di dr. I.G.A.A. R. Wulandari, SpOG,</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

Janin T/H, Letkep, Plasenta posterior, EFW 1900 gram, BPD 8,3 cm, HC 30,4 cm, AC 29,52 cm, FL 6,6 cm, GA 32w1d, EDD 02-03-2026.

Sumber: Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

O: Keadaan umum: baik, kesadaran: *composmentis*, skala nyeri: 3, BB: 74,5 kg, tekanan darah: 121/73 mmHg, MAP: 89 mmHg, suhu: 36,6°C, nadi: 80x/menit, pernapasan: 19x/menit, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab. TFU:  $\frac{1}{2}$  pusat *Prosesus Xipoides*, Mcd: 29 cm, TBBJ: 2.635 gram, DJJ: 153x/menit kuat dan teratur, ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merah muda, oedema (-/-), reflek patella (+/+). Pemeriksaan Laboratorium: Hb: 11,7 g/dl, GDS: 110 mg/dl, protein urine: negatif, glukosa urine: negatif.

A: G3P2A0 UK 31 Minggu 3 Hari T/H *Intrauterine*  
Masalah: Ibu merasakan nyeri punggung

- P:
1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa hasil dalam batas normal. Ibu paham dan menerima kondisi ibu saat ini.
  2. Memberikan KIE terkait:
    - a. Penyebab dari rasa nyeri punggung selama masa kehamilan dikarenakan adanya pertumbuhan janin, bertambahnya berat badan, dan perubahan postur tubuh. Ibu paham.
    - b. Cara mengatasi nyeri punggung ibu dengan mengompres hangat pada area punggung. Ibu bersedia melakukannya dan suami bersedia membantu ibu.
  3. Memberikan ibu terapi suplemen  
SF 2 x 60 mg (XV) Kalsium 1 x 500 mg (XV) dan mengingatkan ibu untuk meminum suplemen kehamilan secara teratur sesuai

1	2	3
	<p>aturan yang diberikan, ibu bersedia dan sudah teratur minum suplemen.</p> <p>4. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 bulan lagi yaitu pada tanggal 05 Februari 2026 atau apabila ada keluhan. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya</p>	
<p>Selasa, 13 Januari 2026 Pk. 18.00 WITA Kunjungan Rumah Ibu "KK"</p>	<p>S: Ibu mengatakan bahwa bagian punggung masih sedikit nyeri, dan sudah diberikan kompres air hangat. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam, ibu tidak ada kesulitan bernafas, ibu hari ini makan sebanyak 2 kali porsi sedang dengan menu nasi, ayam, dan sayur. Hari ini ibu minum air mineral sebanyak 1,5 liter. Pola eliminasi hari ini, BAB 1 kali dan tidak ada masalah, BAK 7 kali. Ibu istirahat siang dari pukul 13.00 WITA - 14.00 WITA. Ibu telah minum suplemen dan masih tersisa.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, skala nyeri: 2, tekanan darah: 120/70 mmHg, MAP: 86,6 mmHg, suhu: 36,5°C, nadi: 81x/menit, pernapasan: 20x/menit. TFU: ½ pusat <i>Prosesus Xipoidu px</i>, MCD: 30 cm</p> <p>A: G3P2A0 UK 32 Minggu 4 Hari T/H <i>Intrauterine</i> Masalah: Ibu merasakan nyeri punggung bawah</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan bahwa dalam batas normal, ibu paham. 2. Memberitahukan ibu cara pemberian kompres air hangat yang dapat dilakukan tiga hari berturut-turut, satu kali sehari selama 15-20 menit. Ibu paham. 3. Mengajukan ibu untuk mengikut kelas ibu hamil, ibu paham dan bersedia mengikuti kelas ibu di Ruang Pertemuan UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan pada 17 Januari 2026.</p>	<p>A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
<p>Sabtu, 17/1/2026 Pk. 09.00 WITA Ruang Pertemuan UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu datang untuk mengikuti Kelas Ibu Hamil dan merasa nyeri punggung bawah sudah berkurang. Gerakan janin dirasakan aktif. Ibu rutin mengonsumsi suplemen dan masih. Ibu masih belum paham jenis-jenis alat kontrasepsi.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, skor nyeri: 1, tekanan darah 112/75 mmHg, MAP: 87,3 mmHg, suhu: 36,4°C, nadi: 79x/menit, pernapasan: 21x/menit, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab, DJJ: 145x/menit kuat dan teratur, ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merah muda, oedema (-/-), reflek patella (+/+). TFU: 2 jari bawah <i>Prosesus Xipoidu</i> px, MCD: 31 cm</p> <p>A: G3P2A0 UK 33 Minggu 1 Hari T/H <i>Intrauterine</i> Masalah: Ibu masih belum paham jenis-jenis alat kontrasepsi</p> <p>P: 1. Menjelaskan keadaan ibu dan janin dalam batas normal, ibu paham. 2. Menjelaskan kembali jenis-jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan setelah bersalin, ibu paham dan berencana menggunakan KB IUD. 3. Memberikan KIE terkait manfaat melakukan <i>prenatal gentle yoga</i>, ibu paham. 4. Mengajak ibu berdoa serta berkomunikasi dengan bayi sebelum melakukan <i>prenatal gentle yoga</i>, ibu bersedia melakukannya. 5. Membantu ibu melakukan gerakan <i>prenatal gentle yoga</i> yang dipandu oleh instruktur yoga, ibu merasa rileks.  Mengingatkan ibu untuk mengikuti kelas ibu hamil bulan depan pada tanggal 14 Februari 2026, ibu bersedia.</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
<p>Kamis, 22 Januari 2026 Pk. 17.00 WITA Kunjungan Rumah Ibu “KK”</p>	<p>S: Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri punggung. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam, ibu tidak ada kesulitan bernafas, ibu hari ini makan sebanyak 2 kali porsi sedang dengan menu nasi, ayam, tempe dan sayur. Ibu hari ini makan buah naga dan pisang. Hari ini ibu minum air mineral sebanyak 2 liter. Pola eliminasi hari ini, BAB 1 kali dan tidak ada masalah, BAK 6 kali. Ibu istirahat siang dari pukul 13.00 WITA - 14.00 WITA. Ibu telah minum suplemen dan masih tersisa untuk 4 kali minum. Suasana hati ibu baik. Ibu tidak ada masalah spiritual. Ibu sedikit lupa persiapan menyusui.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, tekanan darah: 110/70 mmHg, MAP: 83,3 mmHg, suhu: 36,4°C, nadi: 82x/menit, pernapasan: 20x/menit. TFU: 2 jari bawah <i>Prosesus Xipoides</i> px, MCD: 31 cm</p> <p>A: G3P3A0 UK 33 Minggu 6 Hari T/H Intrauterine Masalah: Ibu sedikit lupa persiapan menyusui</p> <p>P: 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan ibu dalam batas normal, ibu paham. 2. Memberikan KIE terkait: a. Manfaat ASI, ibu paham dan akan memberikan ASI sampai usia 6 bulan. b. Mengingatkan kembali ibu teknik menyusui dan posisi menyusui, ibu paham dan mampu mempraktikkan dengan baik. c. Menggunakan bra yang nyaman dan sesuai ukuran, serta membersihkan puting dengan lembut, ibu paham d. Memberitahu ibu untuk makan makanan bergizi dan minum air mineral yang cukup, ibu paham. 3. Mengingatkan kembali ibu untuk rutin minum</p>	<p>A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	4. suplemen dan kontrol kehamilan, ibu paham dan berencana ke Puskesmas pada tanggal 05 Februari 2026.	
<p>Kamis, 05 Februari 2026 Pk. 09.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu mengatakan ingin melakukan pemeriksaan kehamilan dan mengeluh sulit buang air besar. Stimulasi sudah dilakukan. Ibu sempat melihat video youtube terkait teknik menyusui dan telah melakukan perawatan payudara. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu tidak ada kesulitan bernafas, ibu makan terakhir pukul 08.00 WITA porsi sedang dengan menu nasi, ayam, tahu dan sayur. Pada pagi hari ini, ibu minum air mineral sebanyak 3 gelas. Pola eliminasi, sejak dua hari lalu ibu susah buang air besar, BAK: 8x/hari dan tidak ada masalah. Kemarin, ibu tidur malam pukul 22.00 WITA - 06.30 WITA. Suasana hati ibu baik. Ibu tidak ada masalah spiritual. Ibu mengatakan sudah rutin mengonsumsi suplemen, saat ini suplemen ibu sudah habis.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, BB: 75,6 kg, tekanan darah: 114/70 mmHg, MAP: 84,6 mmHg, suhu: 36,7°C, nadi: 84x/menit, pernapasan: 20x/menit, hidung: bersih dan tidak ada pengeluaran sekret, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab, telinga: bersih, leher: normal. TFU: 2 jari di bawah <i>Prosesus Xipioideus</i>, Mcd: 32 cm, TBBJ: 3.100 gram, DJJ: 146x/menit kuat dan teratur, ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merah muda, oedema (-/-), reflek pattela (+/+).</p> <p>A: G3P2A0 UK 35 Minggu 6 Hari T/H <i>Intrauterine</i> Masalah: Ibu mengalami konstipasi</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu paham dan menerima kondisi ibu saat ini.</p> <p>1. Memberikan KIE dan mengingatkan ibu mengenai:</p> <p>a. Penyebab konstipasi kehamilan karena terdapat peningkatan hormon <i>progesterone</i>. Hormon ini menyebabkan relaksasi otot usus, memperlambat gerakan usus, dan membuat feses menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Ibu paham.</p> <p>b. Cara mengatasi konstipasi dengan makan makanan yang berserat seperti buah papaya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, melakukan <i>prenatal yoga</i>/senam hamil, perbanyak minum air mineral. Ibu paham dan bersedia mengikuti saran.</p> <p>c. USG ulang untuk memastikan berat badan janin. Ibu paham dan bersedia.</p> <p>2. Memberikan ibu terapi suplemen: SF 1 x 60 mg (XV) Kalsium 1 x 500 mg (XV) dan mengingatkan ibu untuk meminum suplemen kehamilan secara teratur sesuai aturan yang diberikan, ibu bersedia dan sudah teratur minum suplemen.</p> <p>3. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi atau apabila ada keluhan, ibu bersedia dan berencana kontrol kehamilan ke Puskesmas pada tanggal 19 Februari 2026 sekitar pukul 09.00 WITA</p>	
<p>Selasa, 10 Februari 2026 Pk 17.00 WITA</p>	<p>S: Ibu mengatakan sudah tidak konstipasi. Ibu hari ini tidak ada keluhan. Gerakan janin dirasakan sebanyak 15 kali selama 12 jam, ibu tidak ada kesulitan bernafas.</p>	<p>A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
Kunjungan Rumah Ibu “KK”	<p>Gerakan janin dirasakan sebanyak 15 kali selama 12 jam, ibu tidak ada kesulitan bernafas. Ibu sudah istirahat siang dari pukul 12.00 WITA - 13.00 WITA. Ibu telah minum suplemen. Suasana hati ibu baik dan bahagia. Ibu tidak ada masalah spiritual.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, tekanan darah: 120/70 mmHg, MAP: 86,6 mmHg, suhu: 36,5°C, nadi: 80x/menit, pernapasan: 20x/menit. Mcd: 32 cm, TBBJ: 3.225 gram</p> <p>Leopold I: TFU 2 jari di bawah Prosesus Xipoides, pada fundus teraba bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting.</p> <p>Leopold II: Teraba tahanan memanjang serta ada tahanan di sisi kiri perut ibu, dan teraba bagian kecil di sisi kanan perut ibu.</p> <p>Leopold III: Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagian keras, bulat, melenting dan tidak dapat digoyangkan</p> <p>Leopold IV: Kedua jari pemeriksa tidak bisa bertemu (divergen)</p> <p>A: G3P2A0 UK 36 Minggu 4 Hari Preskep <math>\cup</math> PUKI T/H <i>Intrauterine</i>. Masalah: Tidak ada</p> <p>P: 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan ibu dalam batas normal, ibu paham.</p> <p>2. Menjelaskan manfaat melakukan pijat perineum serta cara melakukan pijat perineum, ibu paham dan akan melakukannya 5 kali dalam seminggu.</p> <p>3. Mengajak ibu berdoa serta berkomunikasi dengan bayi sebelum melakukan <i>prenatal gentle yoga</i>, ibu bersedia melakukannya.</p> <p>4. Membantu ibu melakukan gerakan <i>prenatal gentle yoga</i>, ibu merasakan rileks dan nyaman.</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG ulang di dr. SpOG untuk memastikan berat janin apakah</p>	

1	2	3
	<p>6. janin masuk PAP, ibu paham dan akan melakukan USG ulang di dr. I.G.A.A.R. Wulandari, SpOG pada tanggal 13 Februari 2026 sekitar pukul 18.00 Wita.</p> <p>7. Mengingat kembali ibu untuk rutin minum suplemen dan kontrol kehamilan, ibu paham dan akan kontrol , ibu paham dan akan kontrol kehamilan ke Puskesmas pada tanggal 10 Februari 2026 sekitar pukul 09.00 WITA.</p>	
<p>Jumat 13 Februari 2026 Pk. 18.00 WITA di dr. I.G.A.A.R. Wulandari, SpOG</p>	<p>S: Ibu ingin melakukan pemeriksaan kehamilan dan tidak ada keluhan.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran <i>composmentis</i>, BB: 77 kg, tekanan darah: 110/72 mmHg. Pemeriksaan USG: FHR +, EFW 2804 gram, BPD 9,92 cm, AC 32,57 cm, GA 37w4d, EDD 2-3-2026, kepala sudah masuk PAP (engaged), air ketuban cukup.</p> <p>A: G3P2A0 UK 37 Minggu 4 Hari Preskep ∪ PUKI T/H <i>Intrauterine</i></p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan bahwa dalam batas normal dan ibu kemungkinan besar bisa melahirkan secara normal, ibu merasa senang.</p> <p>2. Memberikan KIE terkait nutrisi dan pola istirahat, ibu paham.</p>	<p>dr. I.G.A.A.R. Wulandari, SpOG</p>
<p>Sabtu, 14/2/2026 Pk. 09.00 WITA Ruang Pertemuan UPTD Puskesmas IV</p>	<p>S: Ibu datang untuk mengikuti Kelas Ibu Hamil dan tidak ada keluhan. Ibu sudah tidak merasa cemas dan telah mendengar musik relaksasi. Setiap pagi ibu rutin jalan santai di temani oleh suami. Gerakan janin dirasakan aktif. Ibu rutin mengonsumsi suplemen dan masih tersisa. Ibu belum mengetahui perawatan nifas dan bayi baru lahir</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, tekanan darah 116/76 mmHg, MAP: 89,3 mmHg,</p>	<p>Bidan “RP” dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>suhu: 36,7°C, nadi: 83x/menit, pernapasan: 20x/menit, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab, DJJ: 142x/menit kuat dan teratur, ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merah muda, oedema (-/-),reflek patella (+/+).Mcd: 33 cm, TBBJ: 3.410 g</p> <p>Leopold I: TFU 3 jari di bawah Prosesus Xipioideus, pada fundus teraba bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting..</p> <p>Leopold II: Teraba tahanan memanjang serta ada tahanan di sisi kiri perut ibu, dan teraba bagian kecil</p> <p>Leopold III: Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagian keras, bulat, melenting dan tidak dapat digoyangkan</p> <p>Leopold IV: Kedua jari pemeriksa tidak bisa bertemu (divergen)</p> <p>A: G3P2A0 UK 37 Minggu 1 Hari Preskep U PUKI T/H <i>Intrauterine</i></p> <p>Masalah: Tidak ada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan keadaan ibu dan janin dalam batas normal, ibu paham.</li> <li>2. Mengajak ibu berdoa serta berkomunikasi dengan bayi sebelum melakukan <i>prenatal gentle yoga</i>, ibu bersedia melakukannya.</li> <li>3. Membantu ibu melakukan gerakan <i>prenatal gentle yoga</i> yang dipandu oleh instruktur yoga, ibu merasa rileks.</li> </ol>	
<p>Kamis, 19 Februari 2026 Pk. 09.00 WITA UPTD Puskesmas IV</p>	<p>S: Ibu mengatakan ingin melakukan pemeriksaan kehamilan dan mengatakan sudah sering kontraksi palsu. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Pijat perineum sudah dilakukan sebanyak 4 kali seminggu. Ibu tidak ada kesulitan bernafas, ibu makan terakhir pukul 07.00 WITA porsi sedang dengan menu nasi, ikan, dan sayur. Ibu minum air</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
Denpasar Selatam	<p>mineral terakhir pukul 08.00 WITA sudah minum 3 gelas. Kemarin, ibu tidur malam pukul 22.00 WITA - 06.00 WITA. Pola eliminasi ibu, BAB 1 kali dan tidak ada masalah, BAK 8 kali dan tidak ada masalah. Ibu bahagia dan merasa cemas mendekati persalinan. Ibu tidak ada masalah spiritual. Ibu sudah rutin mengonsumsi suplemen yang diberikan sebelumnya dan saat ini suplemen sudah habis.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, BB: 81,5 kg, tekanan darah: 120/74 mmHg, MAP: 89,3 mmHg, suhu: 36,5°C, nadi: 80x/menit, pernapasan: 20x/menit, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab. Mcd: 33 cm, TBBJ: 3.410 gram.</p> <p>Palpasi Leopold:</p> <p>Leopold I: TFU 3 jari di bawah Prosesus Xipoides, pada fundus teraba bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting.</p> <p>Leopold II: Teraba tahanan memanjang serta ada tahanan di sisi kiri perut ibu, dan teraba bagian kecil di sisi kanan perut ibu.</p> <p>Leopold III: Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagian keras, bulat, melenting dan tidak dapat digoyangkan</p> <p>Leopold IV: Kedua jari pemeriksa tidak bisa bertemu (divergen)</p> <p>Auskultasi: DJJ: 141x/menit, kuat dan teratur.</p> <p>Ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merah muda, oedema(-/-), reflek patella (+/+).</p> <p>A: G3P2A0 UK 37 Minggu 6 Hari Preskep ∪ PUKI T/H <i>Intrauterine</i>.</p> <p>Masalah: Ibu merasa sedikit cemas mendekati persalinan</p>	

- 
1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa hasil dalam batas normal. Ibu merasa senang dan dapat menerima kondisinya.
  2. Memberikan KIE terkait:
    - a. Memberitahukan ibu tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Ibu mengatakan rencana bersalin di Puskesmas IV Denpasar Selatan didampingi oleh suami, kendaraan yang akan digunakan adalah motor sendiri dan mobil tetangga, menyiapkan dana persalinan dengan BPJS dan tabungan pribadi.
    - b. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda persalinan, ibu paham
    - c. Memberitahu ibu untuk bermeditasi, mendengarkan musik relaksasi hypnobirthing di youtube, dan prenatal gentle yoga untuk mengatasi rasa cemas ibu. Ibu paham dan bersedia untuk melakukan meditasi dan mendengarkan musik relaksasi.
    - d. Memberitahu ibu untuk rajin jongkok dan jalan santai untuk membantu penurunan kepala janin, ibu bersedia.
  3. Memberikan ibu terapi suplemen SF 1 x 60 mg (X) Kalsium 1 x 500 mg (X) dan mengingatkan ibu untuk meminum suplemen kehamilan secara teratur sesuai aturan yang diberikan, ibu bersedia dan sudah teratur minum suplemen.  
Memberitahukan ibu untuk melakukan kontrol kehamilan 1 minggu lagi atau apabila ada keluhan. Ibu mengerti dan akan kontrol
-

1	2	3
kehamilan ke Puskesmas pada tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 09.00 WITA.		
Kamis, 26 Februari 2026 Pk. 09.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan	<p>S: Ibu mengeluh sering buang air kecil saat malam hari. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu tidak ada kesulitan bernafas, ibu makan terakhir pukul 08.00 WITA porsi sedang dengan menu nasi, ayam, dan sayur. Ibu minum air mineral terakhir pukul 08.00 WITA sudah minum 2 gelas. Kemarin, ibu tidur malam pukul 22.00 WITA - 06.00 WITA. Pola eliminasi ibu, BAB 1 kali dan tidak ada masalah, BAK 11 kali. Ibu bahagia dan suami selalu menyemangati. Suplemen masih. Ibu tidak ada .masalah spiritual.</p> <p>USG (23 Februari 2026) di dr. I.G.A.A. R. Wulandari, SpOG, Janin T/H, Letkep, Plasenta posterior, EFW 2300 gram, BPD 8,9 cm, HC 31,48 cm, AC 29,52 cm, FL 6,63 cm, GA 36w 6d, EDD 17-03-2026. kepala sudah masuk PAP (engaged), air ketuban cukup, plasenta posterior.</p> <p>Sumber: Buku Kesehatan Ibu dan Anak.</p> <p>O: Ibu mengeluh sering buang air kecil saat malam hari. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu tidak ada kesulitan bernafas, ibu makan terakhir pukul 08.00 WITA porsi sedang dengan menu nasi, ayam, dan sayur. Ibu minum air mineral terakhir pukul 08.00 WITA sudah minum 2 gelas. Kemarin, ibu tidur malam pukul 22.00 WITA - 06.00 WITA. Pola eliminasi ibu, BAB 1 kali dan tidak ada masalah, BAK 11 kali. Ibu bahagia dan suami selalu menyemangati. Suplemen masih. Ibu tidak ada masalah spiritual. Hasil skrining kesehatan jiwa (EPDS): 7.</p>	Bidan “RP” dan A.A. Istri Wulan

---

Keadaan umum: baik, kesadaran: *composmentis*, BB: 77,7 kg, tekanan darah: 120/74 mmHg, MAP: 89,3 mmHg, suhu: 36,5°C, nadi: 80x/menit, pernapasan: 20x/menit, mata: konjungtiva merah muda, sklera putih, mulut: bibir merah muda dan lembab.

Palpasi Leopold:

Leopold I: TFU 3 jari di bawah *Prosesus Xiploideus*, pada fundus teraba bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting. Mcd: 32 cm, TBBJ: 3.255 gram.

Leopold II: Teraba tahanan memanjang serta ada tahanan di sisi kiri perut ibu, dan teraba bagian kecil di sisi kanan perut ibu.

Leopold III: Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagian keras, bulat, melenting dan tidak dapat digoyangkan

Leopold IV: Kedua jari pemeriksa tidak bisa bertemu (divergen)

Auskultasi: DJJ: 136x/menit, kuat dan teratur.

Ekstremitas bawah: tungkai simetris, warna kuku merahmuda, oedema(-/-), reflek patella (+/+).

A: G3P2A0 UK 38 Minggu 6 Hari Preskep  $\cup$  PUKI T/H  
*Intrauterine*

Masalah: Ibu sering buang air kecil

- P:
1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa hasil dalam batas normal. bu merasa senang dan dapat menerima kondisinya.
  2. Menjelaskan kepada ibu bahwa sering buang air kecil hal yang umum dialami ibu hamil trimester ketiga, karena rahim yang membesar menekan kandung kemih. Ibu paham dan merasa lega
-

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberitahu ibu perbanyak minum pada siang hari untuk menjaga keseimbangan hidrasi, apabila ibu terganggu tidurnya, ibu dapat mengurangi minum air pada malam hari. Ibu paham.</li> <li>4. Memberitahu ibu untuk tidak menahan buang air kecil apabila ada rasa ingin buang air kecil karena dapat memicu infeksi saluran kemih. Ibu paham dan tidak menahan buang air kecil.</li> <li>5. Memberikan ibu terapi suplemen SF 1 x 60 mg (X) Kalsium 1 x 500 mg (X) dan mengingatkan ibu untuk meminum suplemen kehamilan secara teratur sesuai aturan yang diberikan, ibu bersedia dan sudah teratur minum suplemen.</li> <li>6. Mengingatkan ibu terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan perlengkapan persalinan, perlengkapan persalinan sudah terpenuhi.</li> <li>b. Tanda-tanda persalinan, ibu ingat seperti perut mulas-mulas yang teratur dan semakin sering, serta keluar lendir</li> </ol> </li> </ol>	
<p>Rabu, 05 Maret 2026, Pk. 14.00</p> <p>WITA</p> <p>Kunjungan Rumah Ibu “KK”</p>	<p>S: Ibu mengatakan perut terasa mulas tetapi tidak teratur dan hilang saat istirahat. Stimulasi sudah dilakukan. Gerakan janin dirasakan 1 kali dalam 1 jam. Ibu telah minum suplemen dan masih tersisa. Suasana hati ibu baik, tetapi ada perasaan cemas mendekati persalinan. Ibu tidak ada masalah spiritual</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, tekanan darah: 110/70 mmHg, MAP: 83,3 mmHg, suhu: 36,7°C, nadi: 79x/menit, pernapasan: 19x/menit.</p> <p>Leopold I: TFU 3 jari di bawah <i>Prosesus Xipoides</i>, pada fundus teraba bagian besar, bulat, lunak, dan tidak melenting. Mcd: 31 cm, TBBJ: 3.100 gram</p>	

---

Leopold II: Teraba tahanan memanjang serta ada tahanan di sisi kiri perut ibu, dan teraba bagian kecil di sisi kanan perut ibu.

Leopold III: Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagian keras, bulat, melenting dan tidak dapat digoyangkan

Leopold IV: Kedua jari pemeriksa tidak bisa bertemu (divergen)

A: G3P2A0 UK 39 Minggu 6 Hari Preskep U PUKI T/H  
*Intrauterine*

- p:
1. Masalah: Ibu merasa mulas pada area perut  
Menjelaskan hasil pemeriksaan ibu dalam batas normal, ibu paham.
  2. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan tersebut dinamakan kontraksi palsu yang sering terjadi pada trimester ketiga, serta memberitahukan ibu untuk perbanyak istirahat, dan berjalan-jalan santai di sekitar rumah. Ibu paham.
  3. Memberitahukan ibu terkait kontraksi asli, dimana akan ada tanda seperti mulas disertai nyeri perut bawah sampai ke pinggang belakang, durasi kontraksi 30-60 detik dan berulang secara teratur dimana 10 menit bisa 2-3 kali dan biasanya makin kuat disertai keluarnya lendir darah. Ibu paham dan akan ke Puskesmas bila kontraksi terjadi setiap 5 menit sekali.
  4. Mengajak ibu untuk melakukan *gym ball* untuk membantu kepala bayi ke panggul dan mengurangi rasa nyeri akibat perut mulas, ibu merasa nyaman.
  5. Mengajak ibu untuk bersemedi dan memberikkan afirmasi positif, ibu merasa kedamaian dan siap untuk bersalin.
-

## 2. Penerapan Asuhan Kebidanan Ibu “KK” selama masa persalinan kala I hingga kala IV

Tanggal 05 Maret 2026 pukul 02.00 WITA, Ibu “KK” dan suami datang ke UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan mengeluh sakit perut hilang timbul dan keluar lendir bercampur darah sejak pukul 20.00 WITA (05/3/2026). Penulis mengkaji data asuhan selama persalinan berdasarkan data dokumentasi, pengkajian dan asuhan kebidanan yang penulis lakukan selama masa persalinan saat mendampingi ibu “KK” dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6**  
**Penerapan Asuhan Kebidanan Persalinan dan Komplementer pada Ibu “KK” Selama Persalinan di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2026**

Hari/Tanggal/ Waktu/Tempat	Catatan Perkembangan	Tanda Tangan/ Nama
Jumat, 06 Maret Pk. 01.45 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan	<p>S: Ibu mengeluh sakit perut hilang timbul dan ada pengeluaran lendir campur darah sejak pukul 20.00 WITA (05/03/2026) dan tidak ada keluar air merembes seperti ketuban dan gerakan janin dirasakan masih aktif. Ibu tidak ada keluhan saat bernafas, ibu makan terakhir pukul 19.00 WITA (05/3/2026) dengan porsi satu piring dan komposisi ½ piring nasi, 1 potong ayam dan sayur sup. Ibu minum air mineral mineral terakhir pukul 01.00 WITA ± 250 cc (06/3/2026). BAB terakhir pukul 17.00 WITA (05/3/2026) konsistensi lembek, BAK terakhir pukul 01.30 WITA (06/3/2026). Tidak ada keluhan lainnya terkait pemenuhan kebutuhan bio psiko sosial dan ibu mengatakan siap menghadapi proses persalinan, serta sudah membawa perlengkapan bayi dan ibunya.</p> <p>O: Pemeriksaan umum :</p> <p>Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, GCS: E4 V5 M6, tekanan darah: 128/70 mmHg,</p>	Bidan “DP” dan A.A. Istri Wulan

1	2	3
<p>Pk. 02.00 WITA</p>	<p>MAP: 89,3 mmHg, suhu: 36,8°C, nadi: 83x/menit, P: 20x/menit, BB: 78 kg, skala nyeri 5.</p> <p>Pemeriksaan fisik:</p> <p>Wajah: tidak pucat dan tidak ada oedema. Mata: konjungtiva merah muda, sklera putih. Mulut: bibir lembab, tidak pucat. Payudara: bersih, puting susu menonjol dan sudah ada pengeluaran kolostrum. Abdomen: Tidak ada bekas operasi.</p> <p>Palpasi leopold :</p> <p>Leopold I: TFU 3 jari di bawah <i>Prosesus Xipoides</i>, pada fundus teraba bagian besar, bulat, lunak dan tidak melenting (bokong). Mcd: 31 cm, TBBJ : 3.100. Leopold II: Teraba tahanan memanjang ada tahanan di sisi kiri perut ibu, dan teraba bagian kecil di sisi kanan perut ibu. Leopold III: Pada bagian bawah perut ibu teraba satu bagian keras, bulat, melenting dan tidak dapat digoyangkan (kepala) Leopold IV: Kedua jari pemeriksa tidak bisa bertemu (divergen).</p> <p>Auskultasi: DJJ: 144x/menit, kuat dan teratur, perlimaan 3/5. His: 4x/10"/35-40".</p> <p>Ekstremitas: Tidak ada oedema dan refleks patella positif.</p> <p>Genitalia: terdapat pengeluaran lendir bercampur darah, vulva tidak ada oedema, tidak ada varises, dan tidak ada tanda-tanda infeksi, serta pada anus tidak ada hemoroid.</p> <p>Hasil pemeriksaan dalam pukul (02.00 WITA, dilakukan oleh A.A. Istri Wulan dan Bidan "DP"): vulva dan vagina normal, tidak ada kelainan, portio teraba lunak, dilatasi 6 cm, <i>effacement</i> 75%, selaput ketuban utuh,</p>	

---

presentasi kepala, denominator UUK kiri depan, moulase 0, penurunan di Hodge II, Stasion: -2, tidak teraba bagian kecil janin dan tali pusat, kesan panggul normal.

A: G3P2A0 UK 40 Minggu Preskep  $\cup$  PUKI T/H *intrauterine* + Persalinan Kala I Fase Aktif

- P:
1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan dan menerima kondisinya saat ini.
  2. Melakukan informed consent mengenai asuhan yang akan diberikan. Ibu dan suami sudah menandatangani.
  3. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan suami bahwa proses persalinan dapat berjalan dengan lancar dan normal. Ibu dan suami merasa tenang.
  4. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan ibu bersalin dan melibatkan pendamping:
    - a. Membantu ibu mengurangi rasa nyeri dengan membimbing ibu relaksasi napas jika terjadi kontraksi dan bermain *gymball*. Ibu merasa rileks dan nyaman, skala nyeri 3.
    - b. Membimbing suami untuk melakukan *massage* pada punggung bawah ibu dengan melakukan penekanan di area lumbal menggunakan tumit tangan (teknik *counterpressure*). Suami kooperatif dan Ibu merasa rileks. Skala nyeri yang dirasakan ibu setelah diberikan *massage* pada pinggang adalah 3.
  5. Mengajari ibu cara mengedan efektif yang akan digunakan saat memasuki proses persalinan. Ibu paham dan dapat melakukannya.
  6. Memfasilitasi ibu untuk pemenuhan nutrisi. Ibu makan 1 nasi bungkus, minum air mineral  $\pm$  100
-

1	2	3
	<p>cc dan teh hangat ± 150 cc.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, makan dan minum yang cukup di sela-sela kontraksi. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</li> <li>8. Memfasilitasi kebutuhan mobilisasi dan istirahat ibu. Ibu dapat miring kanan, miring kiri dan berjalan kecil di ruangan.</li> <li>9. Menyiapkan alat dan bahan untuk persiapan persalinan. Alat dan bahan sudah siap dan diletakkan di dekat ibu.</li> <li>10. Melakukan pemantauan kesejahteraan ibu, kesejahteraan janin, dan kemajuan persalinan. Hasil tertulis pada lembar partograf.</li> </ol>	
<p>Jumat, 06 Maret Pk. 03.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu mengeluh sakit perut semakin kuat, merasa ingin mendedan dan ketuban pecah spontan.</p> <p>O: Keadaam umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, His: 5x/10"/50", DJJ: 140x/menit, kuat dan teratur, perlimaan 1/5. Terdapat dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol dan vulva membuka, serta pengeluaran lendir bercampur darah bertambah banyak.</p> <p>Hasil pemeriksaan dalam (pada pukul 03.00 WITA dilakukan oleh A.A. Istri Wulan dan Bidan "DP": vulva dan vagina normal, portio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban pecah spontan warna jernih, presentasi kepala, denominator UUK depan, moulase 0, penurunan di Hodge IV, station: +3, tidak teraba bagian kecil janin dan tali pusat, kesan panggul normal.</p> <p>A: G3P2A0 UK 40 Minggu Preskep ♀ PUKI T/H <i>intrauterine</i> + Persalinan Kala II</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami</p>	<p>Bidan "DP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>penjelasan yang diberikan dan menerima kondisinya saat ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan APD lengkap dan mendekatkan alat. Semua sudah siap, alat sudah didekatkan pada ibu.</li> <li>Menyiapkan ibu dalam posisi bersalin. Ibu memilih posisi setengah duduk.</li> <li>Memeriksa DJJ disela-sela kontraksi. DJJ dalam batas normal 146 x/menit kuat dan teratur.</li> <li>Menganjurkan ibu istirahat dan minum disela-sela kontraksi. Ibu dapat miring ke kiri dan minum <math>\pm</math> 50cc teh manis.</li> <li>Memberikan dukungan psikologis kepada ibu bahwa proses persalinan akan berjalan lancar. Ibu mengerti dan merasa sedikit tenang.</li> <li>Memimpin persalinan dan kepala bayi tampak 5-6 cm dari jalan lahir. Ibu dapat mengedan dengan efektif, bayi lahir pukul 03.10 WITA, segera menangis dan gerak aktif, APGAR skor: 9-10, jenis kelamin laki-laki.</li> <li>Menyelimuti bayi di atas perut ibu, bayi tampak hangat.</li> </ol>	
Pk. 03.10 WITA		
Jumat, 06 Maret Pk. 03.10 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan	<p>S: Ibu merasa lega dan senang atas kelahiran bayinya serta perutnya masih terasa mulas.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, TFU setinggi pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, tidak teraba janin kedua dan tampak tanda-tanda pelepasan plasenta. Bayi: tangis kuat, gerak aktif, jenis kelamin laki-laki</p> <p>A: G3P2A0 PSpt B + Persalinan Kala III + Neonatus Aterm <i>Vigorous Baby</i> dalam Masa Adaptasi</p>	<p>Bidan "DP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
Pk. 03.20 WITA	<p>P: Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan dan menerima kondisinya saat ini.</p> <p>Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan cairan ibu, suami membantu ibu untuk minum. Ibu minum air putih ± 50 cc.</p> <p>Memeriksa janin kedua, tidak teraba adanya janin kedua.</p> <p>Melakukan penyuntikan oksitosin 10 IU pukul 03.11 WITA pada paha 1/3 anterolateral paha kanan ibu secara IM. Tidak ada reaksi alergi dan kontraksi uterus baik.</p> <p>Melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat, tidak ada perdarahan.</p> <p>Melakukan IMD dengan meletakkan bayi tengkurap di perut ibu. Bayi aktif mencari puting susu serta <i>skin to skin contact</i> dengan ibu dan terlihat nyaman.</p> <p>Melakukan penengangan tali pusat terkendali (PTT), plasenta lahir pukul 03.20 WITA, plasenta lahir kesan lengkap, dan tidak terjadi pengapuran.</p> <p>Melakukan massase fundus uteri selama 15 detik, kontraksi uterus baik</p>	
Jumat, 06 Maret Pk. 03.20 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan	<p>S: Ibu merasa lega setelah plasenta lahir dan mulas pada perut sedikit berkurang.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran: <i>composmentis</i>, tekanan darah: 122/72 mmHg, MAP: 88,6 mmHg, nadi: 72x/mnt pernapasan 20 x/menit, suhu 36,9°C, TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, terdapat robekan pada mukosa vagina (derajat 1), tidak ada perdarahan aktif. Keadaan bayi : tangis kuat, gerak aktif.</p> <p>A: P3A0 PsptB + Persalinan Kala IV + Laserasi Grade I + Neonatus Aterm <i>Vigerous Baby</i> dalam Masa</p>	Bidan "DP" dan A.A. Istri Wulan

1	2	3
Adaptasi		
Masalah: Tidak ada		
P:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan dan menerima kondisinya saat ini.</li> <li>2. Menjelaskan kepada ibu bahwa luka tidak dilakukan penjahitan karena tidak ada perdarahan aktif, ibu setuju.</li> <li>3. Melakukan eksplorasi cavum uteri, asuhan dilakukan oleh bidan “DP”. Tidak ada bekuan darah, serta tidak ada perdarahan aktif.</li> <li>4. Membersihkan ibu, mendekontaminasi alat dengan klorin, dan merapikan lingkungan. Ibu sudah memakai pembalut dan kain, lingkungan sudah bersih serta alat sudah didekontaminasikan.</li> <li>5. Memantau kemajuan IMD, bayi berhasil mencapai puting susu.</li> <li>6. Membimbing ibu dan suami untuk menilai kontraksi dan melakukan massase fundus. Ibu dan suami kooperatif serta dapat melakukannya.</li> <li>7. Memfasilitasi ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ibu makan 1 nasi bungkus dan minum air putih ± 100 cc.</li> <li>8. Melakukan pemantauan kala IV, pemantuan dilakukan setiap 15 menit pada satu jam pertama, setiap 30 menit pada satu kedua. Hasil terlampir pada lembar partograf.</li> </ol>	
Jumat, 06 Maret Pk. 04.10 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Seatan	S:  O:	Asuhan Neonatus 1 Jam  Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan. Bayi sudah dapat menyusu dan refleks hisap baik.  Keadaan umum: baik, bayi menangis kuat, gerak aktif, warna kulit kemerahan, BBL: 2800 gram, PB: 50 cm, LK/LD: 33/34 cm, Suhu : 36,8°C, HR: 141 x/menit, RR: 45x/menit, Kelainan tidak ada, Anus: +,
		Bidan “DP” dan A.A. Istri Wulan

1	2	3
	BAB/BAK: -/-, IMD berhasil pada menit ke-30.	
	A: Neonatus Aterm Umur 1 Jam <i>Vigerous Baby</i> dalam Masa Adaptasi.	
	P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan dan menerima kondisi bayinya saat ini.	
	2. Melakukan <i>informed consent</i> bahwa akan diberikan injeksi vitamin K dan salep mata. Ibu dan suami bersedia.	
	3. Menyuntikkan vitamin K 1 mg secara IM di paha kiri 1/3 bagian atas anterolateral. Tidak ada reaksi alergi.	
	4. Memberikan salep mata <i>gentamicin sulfate</i> 0,3% pada kedua mata bayi. Salep sudah dioleskan dari arah dalam ke luar.	
	5. Melakukan perawatan tali pusat. Tali pusat bersih dan kering terbungkus dengan kasa steril.	
	6. Membimbing ibu dan suami untuk menjaga kehangatan bayi. Ibu dan suami kooperatif, bayi sudah mengenakan pakaian lengkap dan didekatkan kepada ibu.	
	7. Membimbing ibu cara dan posisi menyusui bayi. Ibu kooperatif dan dapat menyusui dengan posisi duduk.	
Jumat, 06 Maret 2026, Pk. 05.20 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan	S: Ibu masih merasa lelah. Ibu sudah bisa miring ke kiri dan ke kanan. Ibu sudah makan nasi bungkus dan sudah minum sebanyak 600 ml botol air mineral. Ibu sudah istirahat 15 menit. Ibu sudah BAK dan belum BAB.	Bidan "DP" dan A.A. Istri Wulan
	O: Keadaan umum: baik, kesadaran: composmentis, tekanan darah: 116/70 mmHg, nadi: 68x/menit, RR: 20x/menit, suhu: 36,8°C, wajah tidak pucat, konjungtiva merah muda, sklera putih, mukosa bibir	

---

lembab, payudara bersih, terdapat pengeluaran kolostrum pada kedua payudara, TFU: 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan tidak aktif, pengeluaran *lochea rubra*, BAB/BAK : -/+.

Bayi: keadaan umum baik, menyusu kuat, RR: 44 x/menit, HR: 135 x/menit, Suhu: 36,7°C, tidak ada perdarahan tali pusat, BAB/BAK : +/+.

A: P3A0 Pspt B 2 Jam *Post Partum* + Neonatus Aterm  
Usia 2 Jam *Vigorous Baby* dalam Masa Adaptasi  
Masalah : Ibu masih merasa lelah

- P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan dan menerima kondisinya saat ini.
2. Memberikan terapi oral:  
Amoxicillin 3 x 500 mg (X), Paracetamol 3 x 500 mg (X),  
SF 2 x 60 mg (XXX), Vitamin A 1 x 200.000 IU (II)  
Ibu paham dan bersedia mengonsumsi obat yang diberikan.
3. Menginjeksikan HB0 0,5 ml pada 1/3 anterolateral paha kanan bayi. Tidak ada reaksi alergi.
4. Memfasilitasi ibu untuk melakukan mobilisasi. Ibu sudah dapat kiring kanan dan kiri, duduk, berdiri serta berjalan pelan dibantu oleh suami.
5. Memindahkan ibu dan bayi ke ruang nifas. Ibu sudah berada di ruang nifas dan rawat gabung bersama bayi.
-

**3. Penerapan asuhan kebidanan pada ibu “KK” selama masa nifas sampai 42 hari masa nifas**

Asuhan kebidanan masa nifas dimulai setelah persalinan yaitu tanggal 06 Maret 2026 sampai 42 hari masa nifas yaitu tanggal 17 April 2026. Selama masa nifas, penulis melakukan pengamatan terhadap perkembangan ibu “KK” dimulai dari proses involusi, pengeluaran *lochea*, laktasi serta proses adaptasi psikologi ibu terhadap kondisinya setelah bersalin. Perkembangan masa nifas ibu “KK” dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan dan kunjungan rumah. Pemeriksaan nifas ibu “KK” dilakukan sebanyak empat kali sesuai dengan standar asuhan kebidanan masa nifas.

**Tabel 7**  
**Penerapan Asuhan Kebidanan Nifas dan Komplementer pada Ibu “KK” Selama Masa Nifas di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan dan Kunjungan Rumah Tahun 2026**

Hari/Tanggal/ Waktu/Tempat	Catatan Perkembangan	Tanda Tangan/ Nama
KF 1 Jumat, 06 Maret 2026, Pk. 09.40 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan	S: Ibu mengatakan ada keluhan nyeri pada area jalan lahir dan masih lelah. Ibu sudah makan dengan porsi sedang, komposisi nasi, sayur, daging ayam, telur dan tempe. Ibu sudah minum 1,5 liter botol air mineral. Ibu belum BAB dan sudah BAK sebanyak tiga kali. Ibu sudah minum obat sesuai anjuran dan telah mampu untuk duduk, berdiri dan berjalan sendiri. Ibu telah mengganti pembalut sebanyak satu kali. Ibu akan memberikan ASI Eksklusif pada bayi. Pengetahuan yang dibutuhkan yaitu tentang cara melakukan senam kegel, teknik menyusui yang tepat, dan tanda	Bidan “RP” dan A.A. Istri Wulan

---

bahaya masa nifas.

O: Keadaan umum: baik, kesadaran *compos mentis*, tekanan darah: 112/75 mmHg, MAP: 87,3 mmHg, nadi: 80x/menit, RR: 20x/menit, suhu: 36,6°C, skala nyeri: 2, wajah tidak pucat, konjungtiva merah mudah, sklera mata putih, tidak ada oedema, bibir lembab, leher normal, payudara bersih, puting susu menonjol keluar dan tidak ada lecet, pengeluaran kolostrum, TFU: 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan tidak aktif, pengeluaran lochia *rubra*, *Bounding attachment*: ibu menatap bayi dengan lembut, ibu mengajak bayi berbicara dan ibu menyentuh bayi dengan lembut. Ibu sudah bisa menyusui bayi dengan posisi benar.

A: P3A0 Pspt B + 7 Jam *Post Partum*

Masalah:

Ibu belum mengetahui senam kegel

Ibu belum mengetahui metode SPEOS

- P:
1. Menginformasikan hasil pemeriksaan, ibu dan suami paham.
  2. Membimbing ibu untuk cara melakukan senam kegel, ibu mampu melakukan dengan baik.
  3. Memberikan KIE tentang tanda bahaya masa nifas, ibu paham dan mampu menyebutkan kembali.
  4. Memberikan KIE untuk istirahat dan melibatkan suami dalam mengurus bayi, ibu dan suami paham.
  5. Memberikan serta membimbing suami dalam pemberian metode SPEOS, ibu merasa lebih nyaman dan rileks.
-

1	2	3
<p>Sabtu, 07 Maret 2026, Pk. 07.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu tidak ada keluhan, BAB 1 kali sehari dengan tekstur lunak dan BAK 6-7 kali sehari. ASI sudah keluar deras. Ibu sudah makan nasi bungkus, dan kemarin sudah minum air mineral 2 liter botol air mineral, hari ini baru minum air 250 ml. Ibu istirahat malam 7 jam karena harus mengurus bayi. Kemarin, ibu mandi dua kali dan mengganti pembalut 3 kali. Ibu masih dibantu dalam mengurus bayi. Suami selalu membantu ibu dalam mengurus bayi.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, kesadaran <i>compos mentis</i>, tekanan darah: 110/74 mmHg, nadi: 83x/menit, RR: 20x/menit, suhu: 36,8°C, skala nyeri: 1, wajah tidak pucat, konjungtiva merah mudah, sklera mata putih, tidak ada oedema, bibir lembab, leher normal, pengeluaran kolostrum, TFU: 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan tidak aktif, pengeluaran lochia <i>rubra</i>, ibu sudah bisa menyusui bayi dengan posisi yang benar.</p> <p>A: P3A0 PSpt B + 1 Hari <i>Post Partum</i></p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan bahwa dalam batas normal, ibu paham. 2. Mengingatkan ibu untuk menjaga <i>personal hygiene</i>, makan makanan yang bergizi, minum air sebanyak 2 liter sehari, serta minum obat yang telah diberikan. Ibu paham dan bersedia melakukannya. 3. Menginformasikan ibu bahwa hari ini sudah boleh pulang dan kontrol kembali minggu depan pada tanggal 13 Maret 2026. Ibu berencana pulang pukul 10.00 WITA dan bersedia kontrol kembali minggu depan</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
<p>KF 2 Jumat 13 Maret 2026 Pk. 10.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu tidak ada keluhan, pola makan 3 kali sehari dengan porsi sedang, komposisi: nasi, ayam, sayuran. Ibu minum air mineral 2 gelas. Suplemen sudah diminum dan masih tersisa 15 tablet. Ibu BAB 1 kali sehari dengan tekstur lunak dan BAK 8 kali sehari. Ibu istirahat 6-7 jam sehari karena harus mengurus bayi. Ibu mandi 2 kali sehari dan mengganti pembalut 2 -3 kali sehari. Ibu sudah mampu mengurus bayi sendiri. Suami dan ibu kandung membantu ibu dalam mengurus bayi. Metode SPEOS dan senam kegel sudah diberikan. Pengetahuan yang dibutuhkan ibu yaitu kurang mengetahui kebutuhan masa nifas.</p> <p>O: Keadaan umum baik, kesadaran <i>composmentis</i>. BB: 72 kg. Tekanan darah: 123/73 mmHg, MAP: 89,6 mmHg, nadi: 80x/menit, RR: 20 x/menit, suhu: 36,7°C. Wajah tidak pucat, konjungtiva merah muda, sklera putih, mukosa bibir lembab, payudara simetris, pengeluaran kolostrum. TFU : 3 Jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan tidak aktif, pengeluaran <i>lochea sanguinolenta</i>, tidak ada oedema dan tanda homan.</p> <p>A: P3A0 Pspt B + 7 Hari <i>Post Partum</i> Masalah: Ibu belum mengetahui kebutuhan masa nifas</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan. Ibu dan suami paham serta menerima kondisinya saat ini. 2. Memberikan KIE kepada ibu dan suami mengenai: a. Pemenuhan nutrisi pada ibu nifas, yaitu Kebutuhan protein tinggi seperti daging, telur, ikan dan susu. Minum air putih 2 liter perhari.</p>	<p>Bidan "RP" dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>Ibu paham dan bersedia mengonsumsinya.</p> <p>b. Pola istirahat dan mengatur jam tidur sesuai dengan pola tidur bayi. Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan.</p> <p>c. Personal hygiene yaitu rutin mencuci tangan, ganti pembalut minimal 2 kali, dan mencuci organ genitalia dari arah depan ke belakang serta pastikan tetap dalam keadaan kering. Ibu paham mengenai penjelasan yang diberikan.</p> <p>d. Menjaga kehangatan bayi dan memberikan ASI eksklusif secara on demand atau 2 jam apabila bayi tertidur. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</p> <p>e. Peran pendamping selama masa nifas. Suami dan keluarga selalu membantu dan memberikan dukungan kepada ibu.</p> <p>3. Memberikan terapi suplemen: SF 1 x 60 mg (XXX) dan mengingatkan ibu untuk minum suplemen secara teratur sesuai aturan yang diberikan. Ibu bersedia.</p> <p>4. Menyepakati kunjungan rumah yaitu tanggal 20 Maret 2026 pukul 16.00 WITA. Ibu bersedia dan sepakat.</p>	
<p>KF 3 Jumat. 20 Maret 2026 Pk. 16.00 WITA Kunjungan Rumah Ibu “KK”</p>	<p>S: Ibu tidak ada masalah. Ibu dapat menyusui dengan baik. Ibu sudah melakukan metode SPEOS dan rajin melakukan senam kegel. Ibu dapat beristirahat 7 jam perhari (terbangun saat bayi menyusui dan ikut istirahat saat bayi tidur). Ibu sudah mampu mengurus bayi sendiri dan dibantu juga oleh suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus bayi. Pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis dan sosial ibu tidak ada masalah.</p>	<p>A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>O: Keadaan umum baik, kesadaran <i>composmentis</i>. Tekanan darah: 110/70 mmHg, MAP: 83,3 mmHg, nadi: 80x/menit, RR: 20 x/menit, suhu: 36,8°C. Wajah tidak pucat, konjungtiva merah muda, sklera putih, mukosa bibir lembab, payudara simetris, pengeluaran ASI, TFU: tidak teraba di atas simfisis pubis, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan tidak aktif, pengeluaran <i>lochea serosa</i>, tidak ada oedema dan tanda homan. Skor EPDS : 2.</p> <p>A: P3A0 + 14 Hari <i>Post Partum</i> Masalah: Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan. Ibu dan suami paham serta menerima kondisinya saat ini.</p> <p>2. Memberikan KIE dan mengingatkan ibu dan suami mengenai:</p> <p>a. Pemenuhan nutrisi dan hidrasi pada ibu nifas, Ibu paham dan bersedia mengonsumsinya.</p> <p>b. Kebutuhan pola istirahat dan saling bergantian menjaga bayi bersama suami.</p> <p>c. ASI eksklusif secara <i>on demand</i> atau setiap 2 jam apabila bayi tertidur. Ibu mengerti dan ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.</p> <p>3. Memberikan metode SPEOS. Ibu merasa rileks dan nyaman.</p> <p>4. Menepakati untuk melakukan kunjungan rumah tanggal 05 April 2026 Pukul 16.00 WITA. Ibu bersedia.</p>	
<p>KF 4 Minggu, 05 April 2026 Pk. 17.00 WITA</p>	<p>S: Ibu dapat menyusui dengan baik. Ibu sudah melakukan metode SPEOS dan rajin melakukan senam kegel. Ibu dapat beristirahat 8 jam. Ibu sudah mampu mengurus bayi sendiri dan dibantu</p>	<p>A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
<p>Kunjungan Rumah Ibu “KK”</p>	<p>juga oleh suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus bayi. Pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis dan sosial ibu tidak ada masalah. Ibu masih bingung efek samping KB IUD.</p> <p>O: Keadaan umum baik, kesadaran <i>composmentis</i>. Tekanan darah: 110/75 mmHg, nadi: 80x/menit, RR: 20 x/menit, suhu: 36,5°C. Wajah tidak pucat, konjungtiva merah muda, sklera putih, mukosa bibir lembab, payudara simetris, pengeluaran ASI, TFU: tidak teraba, kontraksi uterus baik, kandung kemih tidak penuh, perdarahan tidak aktif, pengeluaran <i>lochea alba</i>, tidak ada oedema dan tanda homan.</p> <p>A: P3A0 PSpt B + 30 Hari <i>Post Partum</i> Masalah: Ibu belum mengetahui efek samping KB IUD</p> <p>P: 1. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami bahwa hasil dalam batas normal. Ibu dan suami paham. 2. Memberikan KIE efek samping KB IUD. Ibu dan suami paham serta sudah memantapkan diri untuk KB IUD karena jangka panjang serta aman untuk ibu menyusui.</p>	
<p>Senin, 20/4/2026 Pk. 09.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu tidak ada keluhan dan ingin menggunakan KB IUD.</p> <p>O: Keadaan umum ibu baik, kesadaran <i>composmentis</i>, BB: 70 kg, TB: 166 cm TD: 110/70 mmHg, nadi: 80x/menit, RR: 20x/menit, suhu: 36,6°C, wajah tidak pucat, konjungtiva merah muda, sklera mata putih, tidak ada oedema, bibir lembab, leher normal, payudara bersih, puting susu menonjol, tidak ada lecet dan tidak bengkak,</p>	<p>Bidan “KS” dan A.A. Istri Wulan</p>

---

pengeluaran ASI, TFU tidak teraba, kandung kemih tidak penuh.

A: P3A0 + 45 Hari *Post Partum* + Akseptor Baru KB IUD

- P:
1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu memahami penjelasan yang diberikan.
  2. Memberikan KIE mengenai efek samping dan lama pemakaian KB suntik IUD. Ibu paham dan mengatakan akan menggunakan KB IUD dan sudah disepakati bersama suami.
  3. Melakukan *informed consent* pada ibu untuk melakukan tindakan. Ibu menyetujui dan tanda tangan.
  4. Melakukan pemasangan KB IUD Coper T 380 A ke dalam rahim ibu, KB sudah terpasang.
  5. Memberikan KIE untuk tetap melanjutkan pemberian ASI eksklusif sampai bayi umur 6 bulan dan dilanjutkan dengan MP-ASI. Ibu mengatakan akan menyusui bayi eksklusif dan dilanjutkan sampai umur bayi 2 tahun.
  6. Menjadwalkan ibu untuk kunjungan kembali pada tanggal 27 April 2026. Ibu mengerti dan bersedia datang kembali sesuai jadwal yang diberikan.
-

#### 4. Penerapan asuhan kebidanan pada bayi ibu “KK” dari neonatus sampai bayi 42 hari

Bayi dari ibu “KK” lahir pada tanggal 06 Maret 2026 pukul 03.10 WITA dengan kondisi langsung menangis, suara tangisan kuat, gerakan aktif, kulit tampak kemerahan, dan berjenis kelamin perempuan. Penulis melakukan pengkajian terhadap asuhan neonatus hingga bayi berdasarkan catatan dokumentasi, hasil pemeriksaan, serta asuhan kebidanan yang diberikan selama mendampingi ibu “KK” dan bayinya, dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 8**  
**Penerapan Asuhan Kebidanan Neonatus dan Komplementer pada Ibu “KK” di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan Dan Kunjungan Rumah Tahun 2026**

Hari/Tanggal/ Waktu/Tempat	Catatan Perkembangan	Tanda Tangan/ Nama
KN 1 Jumat 06 Maret 2026, Pk. 09.40 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan	<p>S: Ibu mengatakan saat ini bayi tidak ada masalah, bayi tidak rewel, bayi menyusu secara eksklusif dan <i>on demand</i>. Bayi sudah BAB 1 kali warna hitam dan sudah BAK 1 kali dengan warna kuning jernih.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, HR: 142 x/menit, RR: 48x/menit, suhu: 36,7°C, BBL: 3180 gram, PB: 52 cm, LK/LD: 35/34 cm.</p> <p>Pemeriksaan fisik: Kepala: simetris, ubun-ubun datar, sutura terpisah tidak ada <i>caput succedaneum</i> dan tidak ada <i>cepal hematoma</i>. Wajah: simetris, tidak pucat, tidak oedema. Mata: simetris, tidak ada pengeluaran. Hidung: tidak ada kelainan, tidak ada pengeluaran, tidak ada nafas cuping hidung. Bibir: mukosa bibir</p>	<p>Bidan “DP” dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>lembab, tidak ada kelainan.</p> <p>Telinga: simetris, tidak ada pengeluaran.</p> <p>Leher: tidak ada pembengkakan kelenjar limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada bendungan vena jugularis.</p> <p>Dada: simetris, tidak ada benjolan pada payudara tidak ada kelainan.</p> <p>Abdomen: tidak ada distensi, tidak ada perdarahan tali pusat, tidak ada tanda-tanda infeksi.</p> <p>Punggung: tidak ada kelainan.</p> <p>Genitalia: testis sudah turun ke skrotum, warna skrotum belum ada pigmentasi, sudah ada lipatan pada skrotum.</p> <p>Anus: terdapat lubang anus.</p> <p>Ekstremitas: bentuk simetris, jumlah jari masing-masing lima pada kedua tangan dan kaki, gerak aktif, tidak ada kelainan.</p> <p>Refleks: <i>grabella</i> positif, <i>morrow</i> positif, <i>tonic neck</i> positif, <i>sucking</i> positif, <i>rooting</i> positif, <i>swallowing</i> positif, <i>graps</i> positif, <i>babinski</i> positif, <i>stapping</i> positif, dan <i>gallant</i> positif.</p> <p>A: Neonatus Aterm Umur 7 Jam <i>Virgorous Baby</i> dalam Masa Adaptasi</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan.</p> <p>2. Memberikan KIE kepada ibu dan suami mengenai:</p> <p>a. Tanda bahaya bayi baru lahir dan gejala anak sakit. Ibu dan suami paham dengan penjelasan yang diberikan.</p> <p>b. Menjaga kehangatan bayi. Ibu dan suami paham, bayi diselimuti memakai topi, popok kain rutin diperiksa dan diganti apabila bayi BAB dan BAK</p>	

1	2	3
	<p>3. Membimbing ibu menyusui bayi secara <i>on demand</i> atau setiap 2 jam sekali jika bayi tertidur. Ibu kooperatif bayi dibangunkan untuk di susui.</p> <p>4. Membimbing ibu dan suami cara perawatan tali pusat bayi. Ibu dan suami dapat melakukannya, tali pusat dijaga agar tetap kering.</p>	
<p>Sabtu 07 Maret 2026, Pk. 07.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Bayi ibu “KK” tidak rewel, bayi menyusu kuat secara eksklusif dan <i>on demand</i>. Pada pagi hari ini, bayi sudah BAB 1 kali warna hitam dan sudah BAK 1 kali dengan warna kuning jernih. Ibu belum mengetahui cara memandikan bayi dan perawatan tali pusat.</p> <p>O: Keadaan umum: baik, HR: 144x/menit, RR: 46x/menit, suhu: 36,7°C, BB: 3180 gram, keadaan tali pusat kering dan bersih.</p> <p>A: Neonatus Aterm Umur 1 Hari Sehat Masalah : Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan bahwa dalam batas normal. Ibu dan suami paham. 2. Membimbing ibu cara memandikan bayi serta melakukan perawatan tali pusat, ibu paham dan berani untuk memandikan bayinya di rumah, serta ibu sudah bisa melakukan perawatan tali pusat. 3. Menjelaskan terkait skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB). Ibu dan suami paham dan bersedia dilakukan PJB. 4. Melakukan pemeriksaan PJB di telapak tangan kanan dan telapak kaki kanan bayi. Hasil SpO<sup>2</sup> pada tangan kanan 97% dan kaki kanan bayi 96%. 5. Menginformasikan terkait tujuan dan prosedur skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Ibu dan suami paham dan bersedia dilakukan SHK. 6. Melakukan skrining SHK pada tumit kanan,</p>	<p>Bidan “DP” dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>sampel sudah diambil.</p> <p>7. Menjelaskan terkait hasil Skrinning Hipotiroid Kongenital (SHK) bahwa hasil akan dikabari lewat pesan, apabila hasil positif. Ibu dan suami paham.</p> <p>8. Mengingatkan ibu untuk menjaga kehangatan bayi dan tetap menyusui bayinya secara <i>on demand</i>. Ibu paham dan akan melakukannya.</p> <p>9. Mengingatkan ibu dan suami untuk kontrol bayi 1 minggu lagi pada tanggal 13 Maret 2026. Ibu dan suami paham, dan bersedia melakukan kunjungan.</p>	
<p>KN 2 Jumat 13 Maret 2026 Pk. 10.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu datang untuk melakukan pemeriksaan bayi. Bayi menyusui aktif on demand. Bayi BAK 8 kali ganti popok kain. BAB 3 kali ganti popok kain. Bayi tidur selama 16-17 jam per hari dan lebih aktif tidur pada siang hari. Ibu sudah berani memandikan bayi serta perawatan tali pusat.</p> <p>O: Keadaan umum bayi baik, tangis kuat, gerak aktif, kulit Kemerahan, BB: 3250 gram, PB: 52 cm, LK/LD: 35/34 cm, suhu: 36,6°C, HR: 138 x/menit, RR: 44 x/menit. Tali pusat sudah lepas, tampak kering, tidak ada tanda infeksi.</p> <p>A: Neonatus Aterm Umur 7 Hari Sehat Masalah: Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan. 2. Mengingatkan ibu untuk menjaga kehangatan bayi. Ibu paham. 3. Menganjurkan ibu memberikan stimulasi pada bayi seperti mengajak bicara, mengenalkan musik lembut, mengajak bermain menggunakan mainan</p>	<p>Bidan “AK” dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>berwarna kontras. Ibu dan suami paham dan bersedia melakukannya.</p> <p>4. Memberitahukan ibu dan suami untuk kontrol 1 minggu lagi pada tanggal 20 Maret 2026 untuk imunisasi BCG dan Polio tetes I. Ibu dan suami bersedia</p>	
<p>KN 3 Jumat. 20 Maret 2026 Pk. 16.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu mengatakan bayinya sehat. Ibu dan suami berencana melakukan imunisasi BCG dan polio I. Bayi menyusu aktif secara on demand. Bayi hanya diberikan ASI. Bayi sudah rutin disendawakan setelah menyusu. BAB dan BAK tidak ada masalah. Bayi sudah diberikan stimulasi dengan mengajak bicara dan bermain menggunakan mainan berwarna kontras.</p> <p>O: Keadaan umum bayi baik, Pemeriksaan fisik kepala bersih, wajah simetris, sklera mata putih, konjungtiva merah muda, bibir lembab, hidung bersih, telinga simetris dan bersih, leher normal, dada simetris dan tidak ada retraksi, perut normal, dan tidak ada pengeluaran, tidak ada tanda ikterus. BB : 3525 gram, PB: 53 cm , LK/LD: 35/34 cm, HR: 136 x/menit, RR: 43 x/menit, suhu: 36,7°C. Tidak ada tanda infeksi pada pusat</p> <p>A: Neonatus Aterm Umur 14 Hari Sehat Masalah: Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami. Ibu dan suami memahami penjelasan yang diberikan.</p> <p>2. Memberikan KIE kepada ibu dan suami mengenai:</p> <p>a. Jenis imunisasi, manfaat dan efek samping dari imunisasi yang diberikan. Ibu dan suami mengerti dan paham.</p> <p>b. Pijat bayi dan menstimulasi tumbuh kembang bayi Ibu dan suami paham.</p> <p>c. Pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6</p>	<p>Bidan ”AK” dan A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>bulan secara <i>on demand</i> atau setiap 2 jam sekali jika bayi tertidur. Ibu kooperatif, bayi dibangunkan untuk disusui dan bersedia memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 2 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan <i>informed consent</i> mengenai tindakan yang akan dilakukan. Ibu dan suami setuju.</li> <li>4. Menginjeksi vaksin BCG dosis 0,05 ml pada lengan kanan atas bayi secara intrakutan. Tidak ada reaksi alergi.</li> <li>5. Memberikan imunisasi polio secara oral sebanyak 2 tetes. Bayi tidak ada muntah atau gumoh.</li> <li>6. Menganjurkan ibu dan suami untuk mengajak bayinya imunisasi DPT- HB- HIB 1, Polio 2, Rotavirus 1 dan PCV 1 saat bayinya berusia 2 bulan. Ibu dan suami mengerti dan bersedia melakukannya.</li> <li>7. Menganjurkan ibu untuk segera datang ke fasilitas kesehatan jika ada keluhan atau tanda bahaya pada bayi. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.</li> </ol>	
<p>Minggu, 05 April 2026 Pk. 17.00 WITA Kunjungan Rumah Ibu “KK”</p>	<p>S: Bayi Ibu “KK” tidak ada masalah, pijat bayi belum dilakukan serta stimulasi seperti melakukan kontak mata dan kontak fisik sudah dilakukan serta sudah sering mengajak bayi berbicara. Bayi aktif menyusu eksklusif. BAB 4-6 kali sehari warna kekuningan, BAK 8 kali sehari.</p> <p>O: Keadaan umum baik, HR: 142 x/menit, RR: 42x/menit, S: 36,6°C. Pemeriksaan fisik: kepala bersih, wajah simetris, bibir lembab, sklera mata putih, konjungtiva merah muda, bibir lembab, hidung bersih, telinga simetris dan bersih, leher normal, dada simetris dan tidak ada retraksi, perut normal.</p> <p>A: Bayi Umur 30 Hari Sehat</p> <p>Masalah: Tidak ada</p>	<p>A.A. Istri Wulan</p>

1	2	3
	<p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan dalam batas normal, ibu paham.</p> <p>2. Melakukan pijat bayi, bayi merasa nyaman.</p> <p>3. Mengingatkan ibu untuk selalu memberikan stimulasi seperti mengajak berbicara, melakukan kontak fisik dan mata, tetap memberikan ASI Eksklusif hingga 6 bulan dan tetap melakukan penimbangan BB setiap bulan. Ibu paham dan akan mengikuti saran, serta berencana untuk melakukan penimbangan di Puskesmas pada hari Selasa, 7 April 2026 Pukul 08.00 WITA.</p>	
<p>Senin, 20/4/2026 Pk. 09.00 WITA UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan</p>	<p>S: Ibu “KK” datang untuk melakukan penimbangan berat badan bayi. Bayi Ibu “KK” tidak ada masalah, pijat bayi sudah dilakukan oleh ibu serta stimulasi dengan mengenalkan musik lembut pada bayi sudah dilakukan. Bayi aktif menyusu eksklusif. BAB 4-6 kali sehari warna kekuningan, BAK 8 kali sehari.</p> <p>O: Keadaan umum baik, BB: 4.050 gram, PB: 54 cm, LK/LD: 35/36 cm, HR: 140 x/menit, RR: 45 x/menit, S: 36,7°C. Pemeriksaan fisik kepala bersih, wajah simetris, bibir lembab, sklera mata putih, konjungtiva merah muda, bibir lembab, hidung bersih, telinga simetris dan bersih, leher normal, dada simetris dan tidak ada retraksi, perut normal.</p> <p>A: Bayi Umur 45 Hari Sehat Masalah: Tidak ada</p> <p>P: 1. Menginformasikan hasil pemeriksaan dalam batas normal, ibu dan suami paham</p> <p>2. Mengingatkan ibu untuk selalu memberikan stimulasi seperti mengajak berbicara, melakukan kontak fisik dan mata, tetap memberikan ASI Eksklusif hingga 6 bulan dan tetap melakukan penimbangan berat badan setiap bulan. Ibu dan suami paham dan bersedia melakukannya.</p>	<p>Bidan “RP” dan A.A. Istri Wulan</p>

## **B. Pembahasan**

### **1. Hasil penerapan asuhan kebidanan kehamilan pada ibu “KK” dari umur kehamilann 17 minggu 6 hari sampai menjelang persalinan**

Dalam memberikan asuhan kehamilan, bidan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan antenatal yang holistik dan terencana, mulai dari deteksi dini faktor risiko, penyuluhan gizi, hingga perencanaan persalinan. Pelayanan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin, serta mendukung kesiapan ibu dalam menghadapi proses persalinan dan masa nifas. Seluruh asuhan diberikan berdasarkan prinsip *women centered care*, yang menempatkan kebutuhan, hak, dan kenyamanan perempuan sebagai prioritas utama dalam pelayanan kebidanan.

Pelayanan kebidanan yang berkesinambungan telah diberikan kepada ibu “KK” sejak kehamilan memasuki usia 17 minggu 6 hari. Selama masa kehamilan, ibu “KK” rutin menjalani pemeriksaan *antenatal care (ANC)* sebanyak dua puluh kali, dengan rincian dua kali pada trimester pertama, lima kali pada trimester kedua, dan tiga belas kali pada trimester ketiga. Dari keseluruhan kunjungan tersebut, delapan kali dilakukan di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan, sedangkan lima kali lainnya dilakukan di praktik dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG). Dalam pelayanan ini, terdapat kegiatan kunjungan ke rumah ibu “KK” sebanyak satu kali pada trimester kedua dan empat kali saat trimester ketiga.

Dalam kehamilan normal, idealnya pemeriksaan *antenatal care (ANC)* dilakukan minimal enam kali, terdiri dari satu kali pada trimester pertama (0–12 minggu), dua kali pada trimester kedua (12–27 minggu), dan tiga kali pada trimester

ketiga (>28 minggu). Di antara semua kunjungan tersebut, sekurangnya dua kali harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, yakni pada kunjungan pertama (sebelum 12 minggu) dan kelima (antara 32–36 minggu kehamilan) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Dalam kunjungan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh Ibu “KK” telah memenuhi standar.

Pemeriksaan kehamilan di dokter kandungan dilakukan juga pada trimester kedua. Hal ini disebabkan karena rasa penasaran oleh Ibu “KK” terhadap janin yang dikandung. Pemeriksaan USG trimester kedua merupakan landasan perawatan prenatal, yang biasanya dilakukan antara minggu ke-18 dan ke-24 kehamilan. Meskipun merupakan bagian rutin dari perawatan obstetri, Ultrasonografi menilai struktur-struktur penting dan mengevaluasi pertumbuhan janin dengan mengukur parameter biometrik, yang sangat penting untuk memperkirakan berat janin. USG trimester kedua tetap menjadi alat skrining dan diagnostik yang berharga, memberikan informasi penting untuk mengelola kehamilan, terutama pada kasus berisiko tinggi (Charocha Ana, 2025)

Selain itu, faktor sosial budaya turut mendorong keputusan ibu untuk melakukan USG, seperti dorongan dari keluarga, pengaruh lingkungan, harapan untuk berbagi foto janin, serta anggapan bahwa USG merupakan bagian penting dari perawatan kehamilan modern. Dalam beberapa konteks, pemeriksaan ini juga diasosiasikan dengan tanggung jawab seorang ibu terhadap kesehatan janinnya, sehingga semakin memperkuat persepsi bahwa USG trimester kedua adalah kebutuhan, bukan sekadar pilihan.

Di sisi lain, pada trimester kedua dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) tetap memberikan suplemen asam folat karena kebutuhan folat selama

kehamilan tidak hanya penting pada trimester pertama, tetapi juga berlanjut hingga trimester kedua dan ketiga untuk mendukung pertumbuhan jaringan maternal, pembentukan sel darah merah, serta perkembangan plasenta dan janin. Selain itu, suplementasi asam folat berperan dalam mencegah anemia megaloblastik pada ibu hamil dan mendukung proses *DNA synthesis* yang berlangsung cepat selama masa pertumbuhan janin. Rekomendasi dari World Health Organization menyatakan bahwa suplementasi asam folat sebaiknya diberikan secara rutin selama kehamilan sebagai bagian dari kombinasi zat besi–asam folat untuk mencegah anemia dan meningkatkan hasil kehamilan (WHO, 2016). Hal ini juga diperkuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merekomendasikan pemberian tablet tambah darah yang mengandung asam folat minimal 90 tablet selama kehamilan guna mendukung kesehatan ibu dan pertumbuhan janin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020b).

Penulis melakukan kunjungan rumah Ibu “KK” sebanyak 5 kali. Kunjungan rumah pada ibu hamil memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal, khususnya dalam mendeteksi dan mengelola kehamilan.

Berdasarkan standar pelayanan kehamilan pada trimester pertama, ibu hamil diwajibkan menjalani pemeriksaan *antenatal care (ANC)* terpadu, yang mencakup pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi infeksi menular seksual serta skrining anemia sesuai dengan Permenkes No. 21 Tahun 2021. Ibu “KK” telah melakukan kunjungan antenatal pertama (K1) di TPBM GA Puspawati pada tanggal 16 Juli 2025 untuk melakukan tes kehamilan karena mengeluhkan mual dan muntah, serta tidak menstruasi pada bulan Juni. Hasil tes menunjukkan dua

garis (positif), yang mengindikasikan kehamilan.

Dalam memastikan diagnosis tersebut, ibu “KK” dianjurkan menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG). Pemeriksaan USG dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2025 di praktik dr. I.G.A.A.R Wulandari, Sp.OG, dengan hasil menunjukkan adanya kantong kehamilan. Selanjutnya, ibu “KK” disarankan menjalani pemeriksaan laboratorium di Puskesmas. Pada trimester pertama, ibu “KK” telah melakukan dua kali kunjungan, yang sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 21 Tahun 2021 dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Namun, ibu “KK” belum melakukan pemeriksaan laboratorium pada usia kehamilan < 12 minggu.

Pada kunjungan ketiga di TPBM GA Puspawati, ibu datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan lanjutan sekaligus mencari buku kesehatan ibu dan anak (KIA). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan kondisi ibu dan janin, serta memastikan pencatatan riwayat kehamilan dilakukan secara lengkap dalam buku KIA sebagai pedoman pemantauan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan.

Pada kunjungan keempat, ibu “KK” melakukan pemeriksaan kehamilan di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Denpasar Selatan pada umur kehamilan 17 minggu 6 hari. Dalam kunjungan tersebut, ibu mendapatkan pelayanan *antenatal care (ANC)* terpadu yang mencakup pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pencatatan hasil pemeriksaan, serta pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selain itu, ibu “KK” juga menjalani rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium, yang terdiri atas pemeriksaan kadar *hemoglobin (Hb)*, protein dan glukosa *urine*, gula darah sewaktu

(GDS), serta pemeriksaan triple eliminasi (HIV, HBsAg, dan sifilis). Selanjutnya, ibu dirujuk secara internal ke poli gigi untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter gigi, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan umum oleh dokter umum. Ibu “KK” tidak mengalami masalah terkait gizi, sehingga tidak dilakukan rujukan internal ke poli gizi.

Berdasarkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (2024), pemerintah menetapkan program pemeriksaan kehamilan standar bagi ibu hamil yang dikenal dengan konsep 12T dalam pelayanan antenatal care (ANC) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Ibu “KK” telah menerima pemeriksaan kehamilan dengan standar 12T, yang mencakup: penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, penilaian status gizi melalui pengukuran lingkaran lengan atas (LiLA), pengukuran tinggi *fundus uteri*, penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi TT, pemberian tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan, pemeriksaan laboratorium, penatalaksanaan kasus, temu wicara antara tenaga kesehatan dan ibu, skrining kesehatan jiwa, serta pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Selama kunjungan ANC, berat badan ibu “KK” selalu dipantau. Sebelum hamil, berat badan ibu 65 kg dan tinggi badan 162 cm, menghasilkan IMT sebesar  $24,7 \text{ kg/m}^2$  yang tergolong normal, sehingga peningkatan berat badan yang dianjurkan selama kehamilan yaitu 11,5 – 16,0 Kg (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020b). Pada akhir kehamilan trimester III, berat badan ibu “KK” yaitu 77,7 kg, sehingga peningkatan berat badan ibu “KK” selama kehamilan yaitu 11,7 Kg. Berdasarkan teori, peningkatan berat badan ibu “KK” dalam kategori

normal.

Selama hamil, ibu memerlukan makanan yang berkualitas dengan jumlah yang cukup (tidak kekurangan dan tidak berlebihan). Untuk memenuhi kebutuhan tubuh ibu selama hamil dibutuhkan menu makanan yang seimbang, dimana semua zat gizinya dibutuhkan tubuh setiap hari, meskipun jumlahnya tidak sama, ada zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan ada pula zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Perbandingan antara karbohidrat, protein, dan lemak dalam menu harian harus sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Pengukuran tinggi badan ibu “KK” dilakukan pada kunjungan *antenatal* pertama di TPMB GA Puspawati, dengan hasil tercatat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu 162 cm. Tinggi badan merupakan salah satu indikator antropometri yang memberikan gambaran proporsi tubuh wanita, dan berperan dalam memprediksi risiko obstetri, seperti kemungkinan terjadinya *cephalopelvic disproportion (CPD)* atau kesempitan panggul. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya cephalopelvic disproportion adalah faktor dari ibu dan bayi. Faktor dari ibu diantaranya tinggi badan kurang dari 145 cm dan ukuran panggul luar maupun dalam di bawah normal, yang tidak mampu dilewati oleh bayi dan faktor pada bayi yaitu bayi berukuran besar (wanita dengan tinggi kurang dari 145cm berpotensi lebih tinggi untuk memiliki panggul sempit.

Tetapi apabila tinggi badan kurang dari 145cm, jika ukuran kepala dan tubuh bayi kecil, misalnya seperti pada bayi lahir prematur dengan usia kehamilan 6-7 bulan, maka persalinan normal masih dimungkinkan. Sebaliknya, jika tinggi badan lebih dari 145cm, jika ada kondisi-kondisi tertentu, bisa saja memiliki kendala untuk melahirkan normal. Temuan ini didukung oleh penelitian (Erick Caesarrani

Asmara, dkk., 2023) yang mengaitkan tinggi badan dengan kejadian CPD. Dengan tinggi badan 162 cm, ibu “KK” berada dalam kategori normal dan tidak termasuk dalam kelompok risiko tinggi terhadap CPD.

Pemeriksaan tekanan darah dilakukan pada setiap kunjungan *antenatal* ibu “KK” sebagai upaya deteksi dini terhadap hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah  $\geq 140/90$  mmHg. Selama kehamilan, tekanan darah ibu “KK” tercatat dalam batas normal, dengan kisaran sistolik 100–120 mmHg dan diastolik 70–80 mmHg. Hasil skrining preeklamsia yang dilakukan oleh dokter umum pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu menunjukkan risiko rendah dan telah dicatat dalam buku KIA. Sebelum hamil, berdasarkan pengakuan ibu “KK”, tekanan darahnya berada pada angka 110/70 mmHg, yang termasuk dalam kategori normal sesuai standar.

Pengukuran lingkaran lengan atas (LiLA) dilakukan sebagai metode penilaian status gizi pada ibu hamil. Pada ibu “KK”, pemeriksaan LiLA telah dilakukan satu kali, yakni pada saat kunjungan antenatal pertama (K1). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, LiLA merupakan salah satu indikator penting dalam menilai status gizi ibu hamil. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyaring ibu hamil yang berisiko mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), yang ditandai dengan nilai LiLA kurang dari 23,5 cm. Hasil pengukuran LiLA pada ibu “KK” menunjukkan angka 29 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu tidak termasuk dalam kategori KEK.

Pengukuran tinggi *fundus uteri* dilakukan pada setiap kunjungan *antenatal* untuk memantau kesesuaian pertumbuhan janin dengan umur kehamilan. Setelah kehamilan memasuki usia 20–24 minggu, pengukuran dilakukan menggunakan pita

ukur dan dapat digunakan untuk memperkirakan berat janin dengan rumus Johnson Toshack. Pada ibu “KK”, hasil pengukuran tinggi *fundus uteri* sesuai dengan umur kehamilan. Saat usia kehamilan 38 minggu 6 hari, tinggi *fundus* tercatat 32 cm dengan kepala janin telah masuk ke pintu atas panggul (PAP).

Berdasarkan rumus Johnson Toshack, perkiraan berat janin adalah 3.255 gram. Rumus ini menghitung berat janin dengan cara tinggi *fundus uteri* (cm) dikurangi 11 atau 12, lalu dikalikan 155, tergantung posisi kepala janin. Jika kepala janin belum masuk PAP, maka dikurangi 12 sedangkan jika sudah masuk PAP, maka dikurangi 11 (Risyanthi dkk., 2021)

Penentuan presentasi janin merupakan bagian penting dari pemeriksaan kehamilan, yang sesuai dengan Permenkes No. 21 Tahun 2021, dilakukan mulai akhir trimester II dan pada setiap kunjungan antenatal selanjutnya. Jika pada trimester III bagian terbawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk pintu atas panggul (PAP), maka perlu diwaspadai adanya kelainan letak, panggul sempit, atau gangguan lainnya. Pemeriksaan dilakukan melalui palpasi Leopold mulai usia kehamilan 36 minggu.

Pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ) merupakan salah satu komponen penting dalam evaluasi kondisi janin selama masa kehamilan dan dilakukan setelah penilaian presentasi janin. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesejahteraan janin serta mendeteksi dini adanya kemungkinan gawat janin yang dapat membahayakan proses kehamilan maupun persalinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, pengukuran DJJ sebaiknya dilakukan mulai akhir trimester pertama dan dilanjutkan secara rutin pada setiap kunjungan antenatal care

(ANC). Rentang DJJ yang dianggap normal berada antara 120 hingga 160 kali per menit. Jika DJJ terdeteksi lebih lambat dari 120 kali/menit (bradikardia) atau lebih cepat dari 160 kali/menit (takikardia), maka kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya gangguan atau kegawatan janin yang membutuhkan penanganan segera. Selama masa kehamilan, ibu “KK” telah menjalani pemeriksaan DJJ secara berkala, dan hasilnya selalu menunjukkan angka dalam rentang normal, yakni antara 130 hingga 150 kali per menit. Pada kunjungan antenatal terakhir, DJJ ibu “KK” tercatat sebesar 136 kali per menit, yang menunjukkan bahwa kondisi janin tetap dalam keadaan stabil dan tidak ditemukan tanda-tanda kegawatan.

Pada kunjungan kehamilan pertama (K1), telah dilakukan skrining terhadap status imunisasi tetanus toksoid (TT) serta diberikan imunisasi TT sesuai dengan hasil skrining tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari standar pelayanan antenatal care terpadu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. Imunisasi TT memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap ibu hamil dan janin, khususnya dalam upaya pencegahan kejadian tetanus neonatorum akibat lingkungan persalinan yang tidak steril. Berdasarkan hasil wawancara pada kunjungan awal, diketahui bahwa ibu “KK” saat bayi telah menerima imunisasi dasar DPT 1, 2, dan 3 dan telah mendapatkan tiga kali imunisasi saat sekolah dasar kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 dan saat kehamilan pertama ibu “KK” sudah mendapat imunisasi Td Dengan demikian, status imunisasi TT ibu “KK” sudah TT 5.

*World Health Organization (WHO)* merekomendasikan konsumsi kalsium sebanyak 500 mg pada waktu yang terpisah dari tablet tambah darah, karena adanya

interaksi antara kalsium dan zat besi. Ibu “KK” telah mengonsumsi kalsium sesuai anjuran, yakni setiap siang setelah makan dengan dosis 500 mg. Suplementasi kalsium selama kehamilan terbukti efektif dalam menurunkan risiko preeklamsia, khususnya pada ibu hamil primigravida. Kalsium berperan penting dalam menjaga kadar ion kalsium dalam rentang fisiologis untuk mencegah hipertensi pada kehamilan yang dapat berkembang menjadi preeklamsia. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan vasokonstriksi serta retensi natrium dan cairan, yang merupakan perubahan fisiologis pemicu preeklamsia. Selain itu, kadar kalsium yang seimbang diperlukan dalam sintesis zat vasoaktif seperti prostasiklin dan *nitric oxide*, yang berperan dalam mempertahankan fungsi endotel dan menurunkan tekanan darah (Wijayanti Ketut dkk., 2020)

Pelayanan antenatal mensyaratkan seluruh ibu hamil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021, pemeriksaan tersebut mencakup golongan darah, kadar *hemoglobin (Hb)*, protein *urine*, dan reduksi *urine*. Selain itu, sesuai Permenkes Nomor 52 Tahun 2017, ibu hamil juga diwajibkan menjalani pemeriksaan triple eliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis B pada trimester I. Pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk mendeteksi dini kemungkinan komplikasi selama kehamilan. Ibu “KK” telah menjalani pemeriksaan laboratorium, namun pemeriksaan triple eliminasi baru dilakukan pada trimester II, tepatnya pada 02 Oktober 2025. Ibu “KK” baru melakukan pemeriksaan laboratorium karena saat usia kehamilan <12 Minggu, Ibu “KK” masih ada kesibukan, sehingga belum sempat melakukan pemeriksaan laboratorium.

Kesibukan menjadi salah satu alasan ibu hamil menunda pemeriksaan triple

eliminasi hingga trimester kedua. Pemeriksaan ini seharusnya dilakukan sejak awal kehamilan untuk mendeteksi infeksi seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B. Namun, keterbatasan waktu akibat pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga membuat ibu hamil sulit datang ke fasilitas kesehatan. Penelitian (Astuti dan Hasrida, 2025) menunjukkan bahwa ibu bekerja cenderung tidak melengkapi pemeriksaan dibandingkan ibu tidak bekerja. Aktivitas harian yang padat juga menghambat akses pemeriksaan tepat waktu. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan diharapkan menyediakan alternatif yang lebih fleksibel untuk ibu hamil dengan kesibukan tinggi.

Studi oleh (Utomo, dkk., 2025) menunjukkan bahwa keterlambatan diagnosis preeklampsia akibat tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium sejak awal kehamilan berkontribusi pada meningkatnya angka kematian ibu di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, (Tampubolon, dkk., 2024) mengungkapkan bahwa anemia pada ibu hamil yang tidak terdeteksi dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, serta gangguan tumbuh kembang janin. Pemeriksaan triple eliminasi juga perlu dilakukan sejak trimester pertama guna mencegah penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Tanpa intervensi dini, infeksi tersebut dapat menyebabkan penularan vertikal (dari ibu ke anak), yang berdampak fatal seperti lahir mati, cacat bawaan, penyakit kronis seumur hidup, dan kematian bayi. Penelitian oleh (Syafaroh dkk., 2026) menekankan bahwa pelaksanaan pemeriksaan triple eliminasi sangat penting dalam menurunkan risiko penularan dan dampak jangka panjang terhadap bayi. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium dan triple eliminasi pada trimester pertama merupakan langkah krusial untuk memastikan kesehatan optimal ibu dan janin selama kehamilan.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa Hb 11,2 gr/dL, golongan darah A+, protein dan reduksi *urine* negatif, serta HIV, sifilis, dan hepatitis B non-reaktif, Pemeriksaan Hb dilakukan kembali di trimester III pada 05 Januari 2026 menunjukkan hasil 11,7 gr/dL

Setelah dilakukan anamnesis, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai standar. Kemudian, dilakukan penatalaksanaan kasus berdasarkan diagnosis dan masalah yang telah ditetapkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020b) menyatakan bahwa setiap kelainan pada ibu hamil harus ditangani sesuai standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Apabila kasus tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan tersebut, maka harus dirujuk sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada ibu “KK”, tidak ditemukan kelainan yang memerlukan rujukan. Namun, ibu mengalami beberapa keluhan umum selama kehamilan, seperti, sembelit, sering buang air kecil, dan nyeri punggung. Di samping itu, ibu “KK” masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait tanda bahaya kehamilan, yoga hamil, teknik mengurangi nyeri punggung, kontrasepsi pascasalin, serta program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

Penatalaksanaan kasus dapat dilakukan melalui kegiatan temu wicara atau konseling. Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021, konseling merupakan bagian dari setiap kunjungan antenatal yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Pada ibu “KK”, konseling difokuskan pada upaya mengatasi keluhan-keluhan yang umum terjadi selama kehamilan.

Gangguan kesehatan jiwa pada ibu hamil tidak hanya berdampak pada

kondisi ibu itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, baik selama dalam kandungan maupun setelah kelahiran, termasuk pada masa kanak-kanak hingga remaja. Ibu “KK” telah menjalani skrining kesehatan jiwa menggunakan *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) (Alin, dkk.,2024)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2025) dalam sosialisasi bulan Januari menyatakan bahwa EPDS salah satu instrumen kuesioner yang umum digunakan untuk mendeteksi depresi pada ibu pascapersalinan, namun juga dapat diterapkan pada ibu hamil. Instrumen ini mampu mengidentifikasi gejala depresi serta mengukur tingkat risikonya, dan banyak digunakan karena bentuknya yang singkat dan mudah diisi. Hasil skrining EPDS pada ibu “KK” saat usia kehamilan 6 Minggu 5 hari menunjukkan skor 6 dan saat usia kehamilan 36 minggu 6 hari menunjukkan skor 7, skor antara 0–12 diinterpretasikan sebagai tidak menunjukkan gejala depresi.

Penerapan nilai budaya lokal “Tri Hita Karana” dalam asuhan kehamilan merupakan suatu konsep pendekatan holistik dalam pelayanan kebidanan. Tri Hita Karana menekankan harmoni antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Dalam praktik *antenatal care*, bidan berperan juga sebagai pendamping spiritual dan emosional. Bidan dapat mengajak ibu untuk menyadari bahwa kehamilan adalah anugerah yang terjadi atas kehendak dan restu Tuhan, sehingga perlu disyukuri dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pendekatan secara holistik memandang individu sebagai satu kesatuan utuh yang mencakup aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan lingkungan. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan keterlibatan ibu dalam menjaga kesehatan kehamilannya. Bidan

wajib menghormati privasi pasien, serta memberikan informasi yang lengkap dan akurat.

*Brain booster* yang diberikan kepada ibu “KK” berupa stimulasi dengan mendengarkan musik *Mozart* pada malam hari, stimulasi sentuhan dan nutrisi, kemudian respons janin dievaluasi melalui pengamatan terhadap gerakan atau tendangan bayi. *Brain booster* merupakan upaya meningkatkan kecerdasan janin selama kehamilan melalui stimulasi otak dan pemberian nutrisi yang tepat. Pendekatan ini mencakup asupan nutrisi pendukung perkembangan otak serta stimulasi musik, khususnya musik Mozart. Selain itu, ibu didorong untuk berinteraksi dengan janin melalui sentuhan, permainan sederhana, dan komunikasi verbal guna merangsang perkembangan kognitif sejak dalam kandungan (Khuzaiyah dan Kristiyanti, 2020).

Pada kehamilan trimester ketiga, ibu “KK” mengeluh sulit buang air besar, sering kencing dan nyeri punggung bawah. Konstipasi pada kehamilan umumnya disebabkan oleh peningkatan hormon *progesteron* yang menurunkan motilitas saluran cerna serta efek tekan dari rahim yang membesar seiring pertumbuhan janin menyebabkan obstruksi mekanis pada usus. Faktor lain seperti pola makan yang kurang serat, asupan cairan yang rendah, aktivitas fisik yang menurun, suplementasi zat besi, dan stres juga turut berperan. Ibu “KK” mengalami keluhan sulit buang air besar dan mengatasinya dengan mengonsumsi buah pepaya. Kandungan enzim papain dan karpaina dalam pepaya membantu melunakkan tinja dan memperlancar pencernaan. Setelah tiga hari mengonsumsi pepaya dan menjalani pola hidup sehat, ibu “KK” melaporkan buang air besarnya kembali lancar (Yanti, dkk., 2022)

Sering buang air kecil pada trimester ketiga merupakan kondisi fisiologis

yang wajar, biasanya terjadi jika frekuensi BAK melebihi 10 kali sehari. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kerja ginjal dan tekanan janin pada kandung kemih. Ibu “KK” mengalami BAK sebanyak 11 kali sehari. Untuk mengurangi keluhan, ibu dianjurkan mengatur waktu dan jumlah asupan cairan, terutama menghindari minum dalam jumlah besar menjelang tidur, sambil tetap menjaga kecukupan hidrasi harian (Riska et al., 2022)

Nyeri punggung selama kehamilan trimester akhir, umumnya disebabkan oleh perubahan postur tubuh akibat pertumbuhan janin yang semakin besar, yang menambah tekanan pada tulang belakang dan otot-otot penyangga tubuh. Selain itu, peningkatan kadar hormon relaksin juga berperan dalam menyebabkan nyeri, karena hormon ini memengaruhi fleksibilitas jaringan ligamen dan meningkatkan mobilitas sendi pada daerah panggul, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan dan rasa nyeri di area punggung bawah. Dalam mengatasi rasa nyeri punggung, ibu “KK” melakukan kompres air hangat dengan dibantu oleh suaminya selama 10-20 menit. Berdasarkan penelitian (Annida dkk.,2024) bahwa kompres hangat memberikan pengaruh yang signifikan dengan dilakukan kompres hangat selama 20 menit. Mekanisme kerja kompres ini mengacu pada teori pengendalian gerbang nyeri (*Gate Control Theory*), di mana panas dari kompres merangsang serabut saraf tipe Ad dan meningkatkan produksi hormon endorfin. Stimulasi ini memperlambat penghantaran sinyal nyeri dari serabut saraf tipe C serta memperbaiki sirkulasi darah dan oksigenasi di area yang nyeri, sehingga sensasi nyeri berkurang. Hal ini sesuai dengan penelitian (Nuranisa dkk.,2025) bahwa terapi kompres hangat dapat digunakan sebagai tindakan nonfarmakologis untuk mengelola nyeri pada persalinan kala I. Dengan demikian, penggunaan kompres

hangat menjadi pilihan yang aman, alami, dan bermanfaat untuk mengurangi keluhan nyeri punggung pada ibu hamil seperti yang dialami oleh ibu “KK” .

*Prenatal yoga* merupakan bentuk latihan yang dirancang khusus untuk ibu hamil, mencakup teknik pernapasan, peregangan ringan, dan relaksasi. Gerakan dalam *prenatal yoga* terbukti dapat mengurangi nyeri punggung bagian bawah pada ibu hamil. Aktivitas ini merangsang tubuh untuk memproduksi hormon endorfin yang berfungsi sebagai analgesik internal yang mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia. Endorfin bekerja dengan memblokir reseptor opioid di sel saraf, sehingga menghambat penghantaran sinyal nyeri ke otak. Selain itu, Peregangan lembut yang dilakukan dalam *prenatal yoga* berperan penting dalam menjaga keseimbangan otot dan fleksibilitas tubuh. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi ketegangan otot dan tekanan pada punggung yang sering dialami oleh ibu hamil. Dengan demikian, *prenatal yoga* tidak hanya efektif dalam mengurangi nyeri punggung, tetapi juga bermanfaat untuk menjaga kesejahteraan emosional ibu hamil, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesiapan fisik menjelang persalinan. Praktik ini dapat dijadikan alternatif alami yang mendukung kehamilan sehat dan nyaman (Yulianti dkk., 2022).

Trimester ketiga kehamilan merupakan periode yang rentan terhadap kecemasan. Kecemasan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin, termasuk risiko persalinan prematur dan gangguan pertumbuhan janin. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi, dukungan emosional, dan pemantauan yang intensif kepada ibu hamil pada trimester ketiga guna mengurangi tingkat kecemasan dan memastikan kesehatan optimal bagi ibu dan bayi (Ridayanti dkk., 2023). Ibu hamil yang cemas dapat mengatasinya dengan

meditasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSI Darus Syifa, ditemukan bahwa meditasi secara signifikan mampu mereduksi kecemasan ibu hamil trimester III. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan skor kecemasan yang cukup besar, yakni dari rata-rata 59,20 menjadi 24,19, dengan nilai  $p=0,000$ , yang menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat kuat. Dibandingkan dengan teknik relaksasi, meditasi memberikan dampak yang lebih besar, dengan rata-rata penurunan sebesar 34,22, sedangkan pada kelompok relaksasi hanya 14,41. Temuan ini menunjukkan bahwa meditasi merupakan salah satu metode non-farmakologi yang efektif untuk membantu ibu hamil mengatasi kecemasan menjelang proses persalinan (Sukarsih dkk, 2021).

## **2. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “KK” selama masa persalinan kala I hingga kala IV**

Persalinan ibu “KK” berlangsung secara normal pada usia kehamilan 40 minggu. Berdasarkan JNPK-KR (2017), persalinan dikatakan normal apabila terjadi antara usia kehamilan 37 hingga 42 minggu, berlangsung secara spontan dengan presentasi belakang kepala, serta tanpa adanya komplikasi pada ibu maupun janin. Proses persalinan diawali oleh kontraksi rahim yang menyebabkan perubahan pada serviks. Oleh karena itu, persalinan ibu “KK” termasuk dalam kategori persalinan fisiologis dan terjadi secara pervaginam.

### **a. Asuhan persalinan kala I**

Proses persalinan kala I ibu “KK” berlangsung selama 7 jam, dihitung mulai dari ibu merasakan sakit perut hilang timbul sejak pukul 20.00 WITA (5/3/2026) hingga ditemukan pembukaan serviks lengkap pada pukul 03.00 WITA (6/3/2026). Menurut JNPK-KR (2017), lama kala I untuk multigravida adalah 6-8 jam. Lama

kala I fase laten Ibu “KK”  $\pm$  4 jam serta lama kala I fase aktif Ibu “KK”  $\pm$  3 jam. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut dalam batas normal.

Pada tanggal 06 Maret 2026 pukul 01.45 WITA, Ibu “KK” datang ke UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan, dengan keluhan nyeri perut yang semakin intens. Setelah berdiskusi dengan suami, keduanya memutuskan untuk segera mencari pertolongan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi umum ibu dalam keadaan baik, dengan tingkat kesadaran *compos mentis*, dan tanda-tanda vital berada dalam batas normal. Pemeriksaan dalam dilakukan pukul 02.00 WITA dengan hasil pembukaan 6 cm dan kontraksi 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 35-40 detik, dan terus meningkat hingga pembukaan lengkap pukul 03.00 WITA dengan kontraksi 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50 detik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kontraksi secara bertahap dan kontraksi ibu adekuat. Kontraksi dianggap adekuat apabila dalam waktu 10 menit terjadi tiga kali atau lebih kontraksi dengan lama kontraksi 40 detik atau lebih (JNPK-KR, 2017).

Dalam asuhan kebidanan pada persalinan, terdapat lima komponen utama yang menjadi dasar dan saling berkaitan untuk menjamin proses persalinan yang bersih dan aman. Kelima komponen ini berlaku baik pada persalinan normal maupun yang disertai komplikasi. Komponen tersebut mencakup pengambilan keputusan klinis, penerapan prinsip asuhan sayang ibu dan sayang bayi, upaya pencegahan infeksi, pencatatan atau dokumentasi rekam medis, serta mekanisme rujukan. Keseluruhan aspek ini harus tercermin dalam setiap tahap asuhan persalinan, mulai dari kala I hingga kala IV (JNPK-KR 2017).

Dalam asuhan persalinan kala I, pengambilan keputusan klinis dimulai

dengan pengumpulan data melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Anamnesis bertujuan untuk memperoleh informasi terkait keluhan, riwayat kesehatan, kehamilan, dan persalinan. Berdasarkan hasil anamnesis pada Ibu “KK”, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai cara mengatasi nyeri persalinan, teknik relaksasi, serta pentingnya inisiasi menyusui dini. Sementara itu, hasil pemeriksaan fisik secara menyeluruh (*head to toe*) tidak menunjukkan adanya kelainan. Asuhan sayang ibu yang diberikan selama kala I meliputi dukungan emosional, bantuan dalam pengaturan posisi tubuh, pemberian cairan dan nutrisi, penerapan teknik relaksasi pernapasan, pengelolaan nyeri dengan bantuan *gymball*, pijat ringan, serta pemenuhan kebutuhan eliminasi dengan memberikan keleluasaan akses ke kamar mandi secara teratur (JNPK –KR 2017).

Selama kala I, Ibu “KK” telah mengonsumsi nasi bungkus dan teh manis. Asupan nutrisi yang memadai pada ibu bersalin menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kelancaran dan kemajuan proses persalinan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan positif antara kecukupan nutrisi dengan kemajuan persalinan. Ibu bersalin yang memperoleh nutrisi cukup cenderung mengalami proses persalinan yang lebih baik dan lancar. Sebaliknya, kurangnya asupan nutrisi, khususnya karbohidrat, dapat menyebabkan tubuh tidak memiliki cadangan energi yang cukup, sehingga memicu oksidasi lemak yang tidak sempurna. Proses ini menghasilkan zat keton seperti asam asetoasetat, aseton, dan asam beta-hidroksi-butirat yang dapat menyebabkan kondisi ketosis. Akumulasi zat keton dalam jumlah berlebih dapat menurunkan efektivitas kontraksi uterus, menghambat kemajuan persalinan, dan meningkatkan risiko terjadinya partus lama. Oleh karena

itu, kecukupan kalori sangat penting untuk menjaga aktivitas uterus tetap optimal selama persalinan (JNPK-KR, 2017).

Ibu “KK” dapat pergi sendiri ke toilet untuk buang air kecil, menandakan bahwa kebutuhan eliminasinya telah terpenuhi. Pemenuhan eliminasi diupayakan dengan menganjurkan ibu untuk BAK minimal setiap satu jam atau kapan pun ibu merasa ingin. Kandung kemih yang penuh dapat menghambat progres persalinan, menimbulkan ketidaknyamanan, serta meningkatkan risiko perdarahan setelah melahirkan dan infeksi (JNPK-KR, 2017).

Asuhan sayang ibu yang diberikan kepada Ibu “KK” yaitu dengan asuhan komplementer untuk mengurangi rasa nyeri dengan *gymball*, *massage* pada area pinggang ibu dengan melakukan penekanan di area lumbal menggunakan tumit tangan (teknik *counterpressure*), dan relaksasi napas. Selama persalinan ibu membutuhkan dukungan dan peran pendamping. Ibu “KK” dibantu oleh bidan dan suami untuk diberikan penanganan mengurangi rasa nyeri.

Pengaturan pola napas merupakan salah satu teknik manajemen nyeri yang terbukti efektif dalam mengurangi rasa nyeri selama persalinan. Melalui proses relaksasi yang dicapai dengan napas teratur, tubuh menjadi lebih tenang, otot-otot rileks, dan aliran darah meningkat. Kondisi ini merangsang pelepasan hormon endorfin, yaitu analgesik alami yang diproduksi oleh tubuh. Endorfin berfungsi sebagai penekan nyeri paling efektif karena mampu menghambat transmisi impuls nyeri dari perifer ke medula spinalis dan mencegahnya mencapai korteks serebri, tempat persepsi nyeri terjadi. Peningkatan kadar endorfin dapat diperoleh secara alami melalui berbagai aktivitas seperti meditasi, teknik pernapasan dalam, konsumsi makanan pedas, serta terapi akupunktur atau kiropraktik (Putri, dkk.,

2024)

Pada asuhan kala I, upaya pencegahan infeksi telah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari perpindahan mikroorganisme dari satu individu ke individu lain, baik dari ibu, bayi baru lahir, maupun petugas kesehatan, sehingga dapat memutus mata rantai penularan infeksi. Tindakan yang diterapkan meliputi mencuci tangan, menggunakan sarung tangan serta alat pelindung diri lainnya, menerapkan teknik aseptis atau aseptik, sterilisasi alat yang telah digunakan, penanganan alat tajam secara aman, serta menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan, termasuk pengelolaan limbah medis yang tepat. Selain itu, kebersihan area genital ibu juga dijaga untuk mencegah terjadinya kontaminasi (JNPK –KR 2017).

Lima benang merah terakhir dalam penerapan asuhan persalinan yaitu dengan melakukan pendokumentasian. Pemantauan dan kala I fase laten persalinan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, kemudian dilanjutkan menggunakan partograf pada fase aktif. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan kesejahteraan ibu, kesejahteraan janin dan kemajuan persalinan. Selama dilakukan pemantauan, kesejahteraan Ibu “KK” dan janin dalam kondisi baik. Kemajuan persalinannya berjalan fisiologis.

b. Asuhan persalinan kala II

Persalinan kala II Ibu “KK” berlangsung selama 10 menit tanpa disertai penyulit dan komplikasi. Menurut penelitian (Nurhaeni, dkk.,2018). Kala II pada Multipara 30 menit, pada multipara proses persalinan pada kala II akan lebih cepat karena adanya pengalaman persalinan yang lalu dan disebabkan oleh otot jalan lahir yang lebih lemas. Persalinan Ibu “KK” berjalan lancar dan ibu dipimpin sebanyak 3 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan adalah *passage, power, passanger,*

psikologis dan posisi.

Persalinan berlangsung cepat karena tenaga ibu (power) baik, kontraksi uterus cukup, dan ibu mampu mengedan dengan efektif. Power adalah faktor penting dalam proses persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan his berpengaruh pada lama persalinan, his lemah cenderung menyebabkan persalinan lebih lama. Adanya kontraksi diikuti dengan adanya relaksasi dan pada setiap his menyebabkan terjadinya perubahan pada serviks, yaitu menipis dan membuka.

Pada kala II persalinan, Ibu “KK” menunjukkan kesiapan psikologis untuk melahirkan. Ibu “KK” diposisikan setengah duduk karena lebih nyaman dan memungkinkan mengedan secara efektif. Kondisi mental ibu berperan dalam kelancaran persalinan, sehingga perlu dipersiapkan sejak masa kehamilan dengan strategi koping non-farmakologis dapat diterapkan guna membantu ibu tetap tenang dan fokus selama persalinan. Teknik pernapasan dalam dan relaksasi dapat mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan membantu tubuh tetap rileks. Dukungan dari pasangan, keluarga, atau tenaga kesehatan juga penting untuk memberikan kenyamanan emosional dan fisik selama proses persalinan. Selain itu, metode seperti *hypnobirthing* dan penggunaan afirmasi dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi ketegangan (Satriani, Astiti dan Suindri, 2022).

Selama kala II, dukungan bidan dan suami membantu Ibu “KK” menjalani persalinan dengan baik. Penolong persalinan berperan penting dalam mencegah dan menangani potensi komplikasi pada ibu dan janin. Selain tindakan medis, konseling dan pemberian informasi yang jelas juga dibutuhkan untuk mengurangi kecemasan ibu dan keluarganya.

Asuhan mencakup pemantauan tanda vital yang menunjukkan hasil normal,

guna mendeteksi kemungkinan komplikasi. Kebutuhan cairan ibu terpenuhi melalui pemberian air mineral dan teh manis hangat dengan bantuan suami sebagai pendamping. Upaya pencegahan infeksi dilakukan dengan menggunakan alat steril dan APD.

Bayi Ibu “KK” lahir spontan, langsung menangis kuat, bergerak aktif, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki skor APGAR 9, menunjukkan kondisi normal. Menurut JNPK-KR (2017), penilaian awal bayi baru lahir didasarkan pada tangisan dan gerakan. Asuhan bayi baru lahir normal diberikan jika bayi cukup bulan, air ketuban jernih, bayi menangis, dan tonus otot baik. Passenger merupakan faktor penting dalam proses persalinan yang mencakup bayi, plasenta, dan air ketuban. Kelainan pada kepala janin dapat menghambat persalinan. Masalah pada plasenta seperti solusio, rest, atau retensio plasenta juga dapat menyebabkan persalinan tidak normal. Selain itu, air ketuban yang keruh, berbau, atau ketuban pecah dini turut memengaruhi kelancaran persalinan.

c. Asuhan persalinan kala III

Proses persalinan kala III pada Ibu “KK” berlangsung selama 10 menit, dimulai sejak bayi lahir pukul 03.10 WITA hingga plasenta lahir pada pukul 03.20 WITA, tanpa adanya komplikasi maupun hambatan. Penatalaksanaan telah dilakukan sesuai prinsip manajemen aktif kala III, yang meliputi pemeriksaan untuk memastikan tidak ada janin kedua, pemberian suntikan oksitosin 10 IU secara intramuskular pada sepertiga paha anterolateral kanan segera setelah bayi lahir, dilanjutkan dengan peregangan tali pusat terkendali (PTT), serta dilakukan *massage fundus uteri* selama 15 detik.

Pemberian oksitosin merangsang kontraksi uterus yang efektif, mempercepat

pelepasan plasenta, dan mengurangi perdarahan. Penegangan tali pusat terkendali (PTT) membantu mengeluarkan plasenta yang sudah lepas dari dinding rahim, namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah perdarahan berlebih. Masase *fundus uteri* merangsang kontraksi uterus agar pembuluh darah terjepit dan perdarahan segera berhenti, hal ini sesuai dengan keuntungan dilakukannya manajemen aktif kala III (JNPK-KR,2017).

Segera setelah lahir bayi Ibu “KK” dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), bayi diletakkan tengkurap di dada ibu untuk *skin to skin* dan dipasangkan topi serta selimut. Bayi Ibu “KK” menunjukkan reaksi mulai mencari puting susu ibu dan menyusu setelah 1 jam dilakukannya IMD. Menurut JNPK-KR (2017), Inisiasi Menyusu Dini (IMD) memberikan berbagai manfaat bagi ibu dan bayi, seperti membantu kontraksi uterus untuk pelepasan plasenta, mencegah perdarahan postpartum, merangsang kolostrum dan produksi ASI, menstabilkan pernapasan serta detak jantung bayi, menjaga suhu tubuh, meningkatkan kekebalan untuk mencegah infeksi, dan mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

d. Asuhan persalinan kala IV

Persalinan kala IV pada Ibu “KK” berlangsung secara fisiologis. Pada proses persalinan, Ibu “KK” mengalami laserasi pada mukosa vagina (*grade I*) dan tidak dilakukan penjahitan pada laserasi, dikarenakan tidak ada perdarahan. Hal ini sesuai dengan JNPK-KR (2017) yang menyatakan bahwa laserasi derajat satu, tidak perlu dijahit jika tidak ada perdarahan dan luka baik.

Selama trimester ketiga kehamilannya, Ibu “KK” telah melakukan pijat *perineum* sebagai upaya pencegahan terjadinya robekan pada jalan lahir saat persalinan. Namun, pada proses persalinan, ibu tetap mengalami laserasi derajat

satu. Hal ini dapat disebabkan oleh teknik mengedan yang belum tepat, serta pelaksanaan pijat *perineum* yang masih belum optimal, baik dari segi cara maupun konsistensi pelaksanaannya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ma'rifah dan Aisyah yang menyatakan bahwa meskipun kelompok intervensi telah melakukan pijat *perineum*, masih terdapat responden yang mengalami laserasi *perineum*, baik derajat satu maupun dua. Hal ini menunjukkan bahwa pijat *perineum* memang dapat membantu mengurangi risiko robekan, namun tidak sepenuhnya menjamin pencegahan laserasi (Ramadhani, Amran dan Lindawati, 2023).

Pada kala IV persalinan, asuhan yang diberikan mencakup pemantauan terhadap tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, kontraksi uterus, kondisi kandung kemih, serta jumlah perdarahan. Pemantauan dilakukan secara berkala, yakni setiap 15 menit selama satu jam pertama dan dilanjutkan setiap 30 menit pada dua jam berikutnya. Pemantauan ini sangat penting karena sebagian besar kasus morbiditas dan mortalitas ibu akibat perdarahan pascapersalinan. Oleh karena itu, peran bidan dalam melakukan observasi pada periode ini sangat krusial. Berdasarkan hasil pemantauan kala IV pada Ibu "KK" menunjukkan hasil dalam batas normal dan tidak ditemukan komplikasi (JNPK-KR, 2017).

Asuhan sayang ibu diberikan dengan melibatkan suami selama proses persalinan, termasuk mengajarkan cara memantau kontraksi uterus dan melakukan pijatan *fundus uteri* guna mencegah perdarahan akibat *atonia uteri*. Selain membimbing secara langsung, ibu dan suami juga diberikan edukasi mengenai tanda bahaya masa nifas serta pentingnya pemberian ASI secara *on demand* kepada bayi. Pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu pun diperhatikan untuk membantu pemulihan energi setelah persalinan.

### **3. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “KK” selama masa nifas sampai 42 hari masa nifas**

Penulis melakukan empat kali kunjungan pada masa nifas Ibu “KK”, meliputi KF 1 hingga KF 4, untuk mengevaluasi kondisi dan pemulihan pasca persalinan. Kunjungan dilakukan di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan dan melalui kunjungan rumah, yang mencakup pemeriksaan fisik, konseling, serta edukasi berdasarkan keluhan ibu dan catatan di buku KIA. Sepanjang masa nifas, kondisi ibu menunjukkan proses pemulihan yang normal dan telah menerima asuhan sesuai standar yang berlaku.

Perkembangan masa nifas dapat dilihat dari perubahan trias nifas yaitu involusi uterus, *lochea* dan laktasi. Involusi adalah proses kembalinya uterus ke ukuran dan kondisi semula seperti sebelum hamil, dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini terjadi melalui pengerutan uterus yang dimulai segera setelah plasenta lahir, disebabkan oleh kontraksi otot-otot polos rahim. Perkembangan involusi dapat dipantau melalui pemeriksaan palpasi untuk mengetahui posisi tinggi fundus uteri (Aprilliani Dan Magdalena, 2023)

Pengukuran TFU Ibu “KK” pada satu hari masa nifas masih teraba 2 jari dibawah pusat, pada kunjungan hari ke tiga (KF 2) TFU 3 jari dibawah pusat, dan pada kunjungan hari ke-14 (KF3) dan hari ke-42 (KF4) TFU sudah tidak teraba. Berdasarkan Andriani dan Yessi (2024) pada hari pertama TFU diatas simpisis pubis atau sekitar 12-14 cm. Hal ini terus berlangsung dengan penurunan TFU 1 cm setiap harinya, sehingga pada hari ketujuh TFU sekitar 5 cm dan pada hari kesepuluh TFU tidak teraba di simpisis pubis. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil.

Pengeluaran *lochea* pada Ibu “KK” sudah sesuai dengan standar yaitu *lochea rubra* pada 10 jam hingga 1 hari postpartum, *lochea sanguinolenta* pada hari ke-3, *lochea serosa* pada hari ke-14 dan pada 30 – 42 hari postpartum sudah terdapat pengeluaran *lochea alba*. Pengeluaran kolostrum sudah terjadi saat kehamilan dan dilakukan proses IMD saat bayi baru lahir untuk merangsang produksi ASI. Jumlah pengeluaran ASI masih sedikit saat awal masa nifas dan semakin bertambah setelah adanya hisapan dari bayi. Rangsangan pada puting saat menyusui memicu pelepasan oksitosin, yang mengakibatkan sel *mioepitel* di jaringan payudara berkontraksi dan mendorong ASI dari *alveolus* ke *duktus laktoferus* (Armini dkk., 2020). Pada Ibu “KK” pengeluaran kolostrum terjadi pada hari pertama hingga ketiga dengan warna kekuningan, kemudian hari ke-14 hingga 42 hari terjadi pengeluaran ASI.

Saat melakukan kunjungan rumah pada hari ke-6, penulis membimbing Ibu “KK” dan suami melakukan relaksasi metode SPEOS untuk membantu melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui. Metode SPEOS adalah penggabungan dari stimulasi pijat *endorphine*, pijat oksitosin, dan sugestif. Pijat *endorphine* dapat merangsang munculnya reflek prolaktin dan oksitosin sehingga meningkatkan volume ASI. Pijat oksitosin juga dapat merangsang hormon oksitosin dan pemijatan ini dilakukan di daerah belakang sampai tulang kosta kelima sampai keenam. Teknik sugestif dilakukan untuk mempersiapkan agar ASI bisa mengalir lancar dan memenuhi kebutuhan bayi sejak hari pertama lahir. Dalam hal ini, ASI ibu “KK” sudah keluar banyak dan telah diberikan motivasi untuk mempertahankan kelancaran pengeluaran ASI dengan terus memberikan ASI (Armini dkk., 2021).

Senam yang diterapkan pada masa nifas yaitu senam kegel. Ibu “KK” telah diberikan senam kegel. Senam kegel adalah bentuk latihan fisik yang dapat dilakukan segera setelah melahirkan, dengan tujuan membantu pemulihan otot-otot yang mengalami peregangan selama kehamilan dan persalinan agar kembali ke kondisi semula dan melakukan senam kegel pada ibu nifas dilakukan untuk percepatan penyembuhan luka perineum ibu nifas. Senam ini bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat fungsi organ reproduksi, khususnya otot perut. Selain itu, senam nifas bermanfaat dalam memperbaiki elastisitas otot perut, otot dasar panggul, serta otot gerak tubuh, sekaligus membantu memperlancar sirkulasi darah (Adhistry, dkk., 2025)

Selama masa nifas, Ibu “KK” dibantu dan diberikan dukungan oleh suami dan orang tua terutama dalam membantu merawat bayi atau melakukan tugas-tugas rumah tangga. Ibu “KK” berencana akan memberikan ASI sampai anak usia 2 tahun. Ibu “KK” mengatakan bahwa suami selalu memberikan semangat, pujian dan membantu Ibu “KK” dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dan merawat bayi selepas pulang bekerja.

Dukungan dari orang terdekat, terutama suami, sangat penting bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan, karena mereka belum sepenuhnya stabil fisik dan psikologis. Dukungan suami mempercepat penyesuaian dengan peran baru sebagai ibu dan membantu bidan dalam memberikan perawatan yang sehat. Suami berperan besar dalam mencegah *postpartum blues* dengan menjadi sumber dukungan emosional dan pengurangan stres. Ibu yang mendapatkan dukungan tersebut cenderung lebih sedikit mengalami gejala *postpartum blues*. Berdasarkan hal tersebut, pendampingan bagi ibu nifas sangat penting dalam perannya merawat

bayi. Peran bidan sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu sangat diperlukan untuk memberikan edukasi tentang perawatan bayi kepada ibu dan suami, serta kebutuhan selama masa nifas (Mage, 2020). Hal ini terlihat dari hasil skrining kesehatan jiwa dengan skor 2, yang menandakan ibu tidak memiliki potensi depresi.

Ibu “KK” membutuhkan layanan kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan dan memberi kesempatan merawat anak serta dirinya setelah melahirkan. Ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk ASI Eksklusif. Ibu sudah mengetahui berbagai metode kontrasepsi. Dalam hal ini, Ibu “KK” diberikan konseling pemilihan KB dengan alat bantu ABPK dan KLOP KB. Ibu sudah menetapkan pilihannya dengan KB IUD. Alasan ibu memilih metode KB tersebut karena KB IUD tidak mengganggu produksi ASI, praktis dan jangka panjang. KB IUD salah satu alat kontrasepsi yang dimasukkan kedalam rahim. IUD merupakan metode kontrasepsi jangka (MKJP). IUD merupakan salah satu alat kontrasepsi yang lebih aman dan efektif dan memiliki efek samping yang lebih kecil dan 140 tingkat kegagalan yang lebih rendah dibandingkan dengan pil KB, suntik dan implant (Nurrasyidah dan Aisyah, 2023).

#### **4. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada bayi ibu “KK” dari neonatus sampai bayi 42 hari**

Bayi Ibu “KK” lahir pada kehamilan cukup bulan yaitu usia kehamilan 40 minggu dengan berat lahir BBL: 3180 gram, PB: 52 cm, LK/LD: 35/34 cm, segera menangis, gerak aktif, kulit kemerahan dan menyusu kuat dari payudara ibu. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan lebih dari atau sama dengan 37-42 minggu dengan berat lahir 2500-4000 gram (Cinta

Nashita,2023).

Asuhan bayi baru lahir yang diberikan pada bayi Ibu “KK” sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan bayi baru lahir meliputi pencegahan infeksi, menilai bayi baru lahir, menjaga kehangatan bayi, mengeringkan bayi, perawatan tali pusat, melakukan IMD, pencegahan infeksi mata, pemberian vitamin K dan pemberian imunisasi HB-0.

Kunjungan neonatus pertama (KN 1) dilakukan pada bayi berumur 6 jam hingga 48 jam. Tujuan kunjungan neonatal adalah untuk memastikan bayi tetap terjaga kehangatannya, memberikan ASI eksklusif, pencegahan infeksi, perawatan mata, dan perawatan tali pusat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Bayi Ibu “KK” sudah diberikan imunisasi HB-0 pada saat berumur 2 jam. Skrinning PJB kritis dilakukan pada hari kedua dengan saturasi oksigen 97% dan 96%, Berdasarkan Taufiq Hidayat, 2025 hasil skrinning PJB dikatakan normal apabila hasil pemeriksaan pada salah satu ekstremitas  $\geq 95\%$  dan perbedaan saturasi ekstremitas atas dan bawah  $\leq 3\%$ , sehingga hasil bayi Ibu “KK” dalam batas normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi Ibu “KK”. Waktu pengambilan spesimen darah yang paling ideal adalah ketika bayi berumur 48 jam – 72 jam, hal ini karena selama 24 jam pertama setelah lahir kadar TSH bayi masih tinggi sehingga tidak efektif untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya hipotiroid kongenital dan mencegah hambatan pertumbuhan dan retardasi mental pada bayi baru lahir. Ibu “KK” mengatakan bahwa tidak mendapatkan pesan dari pihak laboratorium, sehingga hasil SHK negatif.

Kunjungan neonatus kedua (KN 2) dilakukan pada saat bayi berumur tujuh

hari, dalam hal ini dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi, memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif dengan baik, serta menilai adanya tanda bahaya atau gangguan kesehatan pada neonatus. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kondisi tali pusat agar tetap bersih dan kering, pencegahan infeksi, serta pemberian edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan bayi sehari-hari, termasuk menjaga kebersihan, kehangatan, dan pola menyusui yang benar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Bayi diberikan kebutuhan asah, asih, dan asuh. Perawatan bayi sehari-hari dibantu oleh suami dan ibu kandung dari Ibu “KK”, sehingga semua anggota keluarga turut serta merawat bayi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bayi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan interaksi dengan orang tua meliputi asah, asih dan asuh (Amelia, 2023). Selama kunjungan, dilakukan penilaian kecukupan gizi dengan memastikan bayi mendapatkan ASI, menjaga suhu tubuh tetap hangat, dan mempersiapkan imunisasi. Bayi belum mendapatkan imunisasi BCG dan polio I dan terjadwal pada tanggal 20 Maret 2026 di UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan. Bayi tidak tampak kuning dan menyusui secara *on demand*. Ibu berencana memberi bayi ASI eksklusif sampai 2 tahun.

Berat badan bayi mengalami peningkatan sebanyak 870 gram dari berat badan lahir 3180 gram menjadi 4050 gram saat usia 1 bulan termasuk dalam kategori normal. Secara umum, bayi baru lahir yang sehat mengalami kenaikan berat badan sekitar 20–30 gram per hari, atau sekitar 600–900 gram dalam bulan pertama kehidupan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), yang menyatakan bahwa rata-rata penambahan berat badan bayi baru lahir

adalah 20–30 gram per hari sehingga pada usia satu bulan berat badan mencapai sekitar 3,5 kilogram. Dengan demikian, penambahan berat badan sebesar 753 gram pada usia 1 bulan menunjukkan bahwa bayi mengalami pertumbuhan yang wajar, mencerminkan asupan nutrisi yang cukup dan perkembangan yang optimal.

Saat melakukan kunjungan rumah pada hari ke-6, penulis melakukan pijat bayi. Pijat bayi membuat bayi menjadi lebih tenang dan mampu beristirahat secara optimal. Aktivitas yang maksimal membuat bayi lebih cepat merasa lapar, yang pada gilirannya meningkatkan nafsu makan. Peningkatan nafsu makan ini turut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas *nervus vagus* (saraf otak yang mengatur fungsi dari leher hingga rongga dada dan perut), yang berperan dalam merangsang gerakan peristaltik untuk mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Dengan demikian, pencernaan menjadi lebih lancar dan bayi lebih cepat merasa lapar. Sehingga, bayi akan lebih sering menyusu, yang akhirnya merangsang produksi ASI lebih banyak. Penulis membimbing ibu “KK” untuk melakukan pijat bayi, agar bayi dapat merasakan kasih sayang dan kelembutan dari orang tua melalui pijat bayi. Kasih sayang merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan bayi.

Asuhan dasar yang diberikan kepada bayi dari Ibu “KK” mencakup tiga aspek utama, yaitu asah, asih, dan asuh. Asah mengacu pada pemberian stimulasi yang esensial bagi proses tumbuh kembang anak. Asih merupakan pemenuhan kebutuhan emosional yang membentuk hubungan harmonis dan erat antara ibu dan bayi. Sementara itu, asuh mencakup pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari bayi, seperti pemberian nutrisi, pemeliharaan eliminasi, serta aspek perawatan lainnya. Stimulasi (asah) dapat dimulai sejak masa kehamilan dan dilanjutkan setelah

kelahiran, salah satunya melalui pemberian ASI sedini mungkin. Pada bayi Ibu “KK”, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) telah dilakukan segera setelah lahir sebagai langkah awal yang penting untuk merangsang dan mempermudah proses menyusui. Selain itu, stimulasi lanjutan diberikan melalui interaksi verbal dengan bayi, pijat bayi, serta pemberian mainan yang memiliki warna mencolok dan mengeluarkan suara guna merangsang perkembangan sensorik dan motorik bayi.

Asih atau kebutuhan emosional diperlukan pada tahun pertama kehidupan sejak dalam kandungan untuk menjamin mantapnya tumbuh kembang fisik, mental dan psikososial anak. Ibu “KK” telah dibimbing untuk melakukan kontak fisik, kontak mata dan rutin mengajak bayi berbicara. Sejak lahir, bayi telah mendapatkan kontak fisik melalui IMD. Ibu “KK” juga menjalin interaksi dengan melakukan kontak mata dan berbicara saat memandikan bayinya. Hal ini menandakan adanya hubungan emosional yang kuat antara ibu dan anak.

Asuh mencakup pemenuhan kebutuhan dasar bayi melalui perawatan harian, seperti pemantauan berat badan dan panjang badan secara berkala, pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, serta imunisasi sesuai jadwal. Pada bayi dari Ibu “KK”, IMD telah dilakukan segera setelah kelahiran. Ibu juga telah menyatakan komitmennya untuk memberikan ASI eksklusif. Penimbangan berat dan panjang badan telah dilakukan satu jam pascapersalinan, dan ibu dianjurkan untuk melakukan pemantauan rutin setiap bulan. Pemberian imunisasi dilakukan sesuai ketentuan, imunisasi hepatitis B diberikan dua jam setelah lahir, dan imunisasi BCG serta Polio 1 diberikan saat bayi berusia 14 hari.