

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pemberian asuhan kebidanan sesuai standar secara komprehensif dan berkesinambungan pada Ibu “KL” beserta bayinya sejak umur kehamilan 15 minggu hingga 42 hari pasca persalinan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuhan kebidanan kehamilan Ibu “KL” berlangsung secara fisiologis dan sudah dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan pada masa kehamilan yang mencangkup 12T. Kunjungan ANC yang dilakukan ibu sudah sesuai standar.
2. Persalinan Ibu “KL” berlangsung secara fisiologis. Asuhan yang diterapkan sudah sesuai standar.
3. Asuhan kebidanan selama masa nifas Ibu “KL” berlangsung secara fisiologis dan kunjungan yang dilakukan sesuai standar (KF 1, KF 2, KF 3, dan KF 4). Metode kontrasepsi yang digunakan adalah KB Implant setelah 42 hari masa nifas.
4. Asuhan kebidanan pada bayi Ibu “KL” dari neonatus usia 6 jam sampai bayi berusia 42 hari dilakukan sesuai standar. Kunjungan neonatus (0-28 hari)

dilakukan dengan KN 1, KN 2, dan KN 3. Asuhan bayi usia 29-42 dilakukan dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, dengan hasil dalam batas normal sesuai usia. Imunisasi yang didapatkan berupa HB 0, BCG, Polio 1 dan telah dilaksanakan tepat waktu.

B. Saran

1. Bagi ibu dan keluarga

Diharapkan setelah diselesaikannya laporan ini, ibu mampu mengaplikasikan asuhan yang diberikan penulis secara mandiri sebagai pengalaman apabila kedepannya kembali dihadapkan pada proses kehamilan, persalinan, nifas dan perawatan bayi sehari-hari. Penulis juga berharap kedepannya ibu tetap meneruskan pemberian ASI eksklusif, memantau tumbuh kembang bayinya, rutin membawa bayinya keposyandu serta memberikan bayinya imunisasi dasar lengkap.

2. Bagi petugas Kesehatan

Diharapkan kedepannya petugas pemberi layanan kesehatan memerdayakan ibu agar bisa melakukan asuhan secara rutin dan mandiri dirumah sehingga tidak ketergantungan dengan petugas kesehatan dan adanya kegawatdaruratan lebih cepat terdeteksi karena pengetahuan ibu yang baik

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan tugas akhir ini dapat dipakai menjadi salah satu referensi dipergustakaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai standar secara komprehensif dan berkesinambungan dari kehamilan trimester III hingga 42 hari masa nifas,

sehingga asuhan yang diberikan kedepannya lebih optimal dan dapat dikembangkan

4. Bagi penulis selanjutnya

Diharapkan mahasiswa penulis selanjutnya sebelum memulai pemberian asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan agar mendalami pengetahuan dan ketrampilan seputar asuhan yang akan diberikan, mencari standar asuhan terbaru sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta menambah wawasan seputar asuhan komplementer agar saat memberikan asuhan sesuai *evidence based practice* dan dilakukan secara optimal