

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Geffari, M. (2012). Comparison of different screening tests for diagnosis of diabetic peripheral neuropathy in Primary Health Care setting, 6(2), 109–115.
- Al-Rubeaan, K., Al Derwish, M., Ouizi, S., Youssef, A. M., Subhani, S. N., Ibrahim, H. M., & Alamri, B. N. (2015). Diabetic foot complications and their risk factors from a large retrospective cohort study. *PLoS ONE*, 10(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0124446>
- Ali, F. A., Memon, A. S., & Iqbal, A. (2012). Relationship of Ankle Brachial Index with Age, Body Mass Index, Smoking and Lipid Profile. *P J M H.S*, (3), 536–540.
- American Diabetes Association. (2017). STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES — 2017 Standards of Medical Care in Diabetes d 2017, 40(January).
- Ananda D. Putri, Edwin, H., & Setyawati, P. (2010). Gambaran Ankle Brachial Index (ABI) Penderita Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 Di Komunitas Senam Rumah sakit Immanuel Bandung, 9(Dm).
- Anggraini, D., Hidayat, W., Studi, P., Keperawatan, S., Yarsi, S., & Bukittinggi, S. (2013). Korelasi Kadar Gula Darah Dengan Nilai Angkel Bracial Indeks ( Abi ) Pasien Diabetes Melitus Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Tahun 2013, I(I).
- Armstrong, D. G. (2014). The 10-g monofilament: The diagnostic divining rod for the diabetic foot? *ResearchGate*, (August 2000). <https://doi.org/10.2337/diacare.23.7.887>
- Azhara, N., & Kresnowati, L. (2014). Faktor Risiko Diabetes Melitus Tipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungundu Kota Semarang Tahun 2014. *Fakultas Kesehatan Udinus*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018. (2018). Hasil utama

riskesdas 2018, 61. <https://doi.org/1> Desember 2013

Be Healthy Enthusiast. (2012). Diabetic Foot Ulcer.

Boulton, A. J. M. et al. (2008). *Comprehensive Foot Examination and Risk Assessment* (Vol. 31). <https://doi.org/10.2337/dc08-9021>

BPJ. (2014). The ankle-brachial pressure index : *National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases*, (60), 18–25.

Butarbutar, F. (2012). Karakteristik Penderita Diabetes Mellitus Dengan Komplikasi Yang Di Rawat Inap Di RSUD Deli Serdang Tahun 2012. *Jl. Universitas Kampus USU Medan*, (21).

Callaghan et al. (2014). NIH Public Access, 11(6), 521–534. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(12\)70065-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70065-0).Diabetic

Cornblath, D. R. (2004). Diabetic neuropathy: diagnostic methods —. *Advanced Studies in Medicine*, 4(September), 650–661.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali. (2016). Profil Kesehatan Bali 2016.

Edwina, D. A., & Manaf, A. (2012). Artikel Penelitian Pola Komplikasi Kronis Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Rawat Inap di Bagian Penyakit Dalam RS . Dr . M . Djamil, 4(1), 102–106.

Eriska, Y., Adrianto, A., & Basyar, E. (2017). Kesesuaian Tipe Tensimeter Pegas dan Tensimeter Digital Terhadap Pengukuran Tekanan Darah Pada Usia Dewasa, 6(2), 940–946.

Haris, M., Indirawaty, & Muh.Askar. (2017). Pengaruh Senam Kaki Diabetik Terhadap Sensitivitas Neuropati Perifer Pada Penderita Diabetes Tipe II. *Jurnal Luka Indonesia*, 4(3), 5–10.

Hastuti, R. T. (2008). Faktor - Faktor Risiko Ulkus Diabetika Pada Penderita Diabetes Melitus.

Hutapea, S. F., Kembuan, A. H. N. M., & Maja, J. P. S. (2016). Gambaran klinis neuropati pada pasien diabetes melitus di Poliklinik Neurologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou periode Juli 2014 – Juni 2015. *Jurnal E-Clinic (eCl)*, 4(1), 1–5.

IDF, 2017. (2017). *Eighth edition 2017*. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31679-8](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31679-8).

Jayawisesa, P. P., Joko, A., & Rahmat, B. (2018). Perbandingan Hasil Pengukuran Ankle Brachial Index ( ABI ) Pada Pasien Dengan Diabetes Melitus Terkontrol dan Tidak Terkontrol di Rumah Sakit Provinsi NTB, 1–18. Retrieved from [http://eprints.unram.ac.id/7370/1/NASKAH\\_PUBLIKASI MADE JAYAWISESA PRIYAMBHADA PUTRA H1A014042.pdf](http://eprints.unram.ac.id/7370/1/NASKAH_PUBLIKASI MADE JAYAWISESA PRIYAMBHADA PUTRA H1A014042.pdf)

Kemenkes RI. (2013). Diabetes Melitus Penyebab Kematian Nomor 6 di Dunia. *Dipublikasikan Pada : Minggu, 08 September 2013, 00:00:02.* <https://doi.org/10.1152/jn.90471.2008>

Kumar V, Cotran RS, R. S. (2007). Buku Ajar Patologi edisi 7volume 2, 8–30.

Laksmi, I. A. A., Mertha, I. M., & Widianah, L. (2013). Pengaruh Foot Massage Terhadap Ankle Brachial Index ( ABI) Pada Pasien DM Tipe 2 Di Puskesmas II Denpasar Barat.

Mangiwa, I., Mario E. Katuk, & Lando Sumarauw. (2017). Pengaruh Senam Kaki Diabetes Terhadap Nilai Ankle Brachial Index Pada Pasien Diabetes Melitus. *eJournal Keperawatan*, 5.

McLaughlin, S., Chaney, D., Belton, A., & Garst, J. (2015). International Standards For Education Of Diabetes Health Profesional. *International Diabetes Federation*.

Maulana, I. (2012). Analisis Komplikasi yang Berhubungan Dengan Kejadian Silent Coronary Artery Disease Pada Pasien Riwayat Diabetes Melitus Tipe 2. *Analisis Komplikasi..., Irfan Maulana, FIK UI, 2012*.

Nursalam. (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. In P. P. Lestari (Ed.) (Edisi 4). Jakarta: Salemba Medika.

Nyamu, P. N., Otieno, C. F., Amayo, E. O., & McLigeyo, S. O. (2003). Risk factors and prevalence of diabetic foot ulcers at Kenyatta National Hospital, Nairobi. *East African Medical Journal*, 80(1), 36–43. <https://doi.org/10.4314/eamj.v80i1.8664>

Of, S., & Carediabetes, M. (2017). Standards Of Medical Care In Diabetes — 2017 Standards of Medical Care in Diabetes d 2017, 40(January).

Parisi, R., Giannella, I. D., Tulio, I. I., Fernandes, D., Karla, I. I. I., Rezende, F., & I, I. V. M. N. (2011). Diabetic foot screening : study of a 3000 times cheaper instrument, 66(6), 1105–1107. <https://doi.org/10.1590/S1807-59322011000600032>

Parisi, M. C. R., Neto, A. M., Menezes, F. H., Gomes, M. B., Teixeira, R. M., Egídio, J., ... Colares, Q. (2016). Baseline characteristics and risk factors for ulcer , amputation and severe neuropathy in diabetic foot at risk : the BRAZUPA study. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 1–8. <https://doi.org/10.1186/s13098-016-0126-8>

Parson, H. K., & Ward, S. A. (2006). Diabetic peripheral neuropathy : How reliable is a homemade. *The Journal Of Family Practice*, 505–508.

Price & Wilson. (2006). *Patofisiologi: Konsep Klinis, Proses-proses Penyakit.*, Jakarta: EGC.

Purwanti, O. S. (2010). Kejadian Ulkus Kaki Pada Pasien Diabetes. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Kesehatan*, 130–134.

Rahmaningsih, B. Y., Hidayat, N., & Mahmuda, I. N. N. (2016). Hubungan Antara Nilai Ankle Brachial Index Dengan Kejadian Diabetic Foot Ulcer Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2, 1–19.

Rahmawati, A., & Hargono, A. (2018). Dominant Factor of Diabetic Neuropathy on Diabetes Mellitus Type 2 Patients. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.20473/jbe.v6i12018.60-68>

Rusandi, D., Prabowo, T., Adinugraha, T. S., Jenderal, S., Yani, A., & Yogyakarta, P. K. (2015). Pengaruh Senam Kaki Diabetes Terhadap Tingkat

Sensitivitas kaki Dan Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Melitus.  
*Media Ilmu Kesehatan Vol.4, no.1, April 2015, 4(1), 44–54.*

Ruth Bryant, D. N. (2006). *Acute & Chronic Wounds : Current Management Concepts* (Third). St.Louise: Mosby Elsevier.

Sacks, D., Bakal, C. W., Beatty, P. T., Becker, G. J., Cardella, J. F., Raabe, R. D., ... Lewis, C. A. (2003). Position Statement on the Use of the Ankle Brachial Index in the Evaluation of Patients with Peripheral Vascular Disease A Consensus Statement Developed by the Standards Division of the Society of Interventional Radiology, 1991.  
<https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000094611.61428.3b>

Santosa, A., & Listiono, D. (2017). Prediksi Score Ankle Brachial Index (Abi) Ditinjau Dari Tanda Gejala Peripheral Arterial Disease (Pad). *MEDISAINS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan*, 15(2), 118–128. Retrieved from <http://jurnalmasional.ump.ac.id/index.php/medisains/article/view/1649>

Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2002). Scanned by CamScanner. In *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* (pp. 1220–1225, 1256, 1267–1269, 1274).

Soegondo, S., R, A. B., & Waspadji, S. (2009). Scanned by CamScanner. In *Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu* (pp. 19–20, 165–169, 175–176).

Srivastava, S. K., Ramana, K. V, & Bhatnagar, A. (2005). Role of Aldose Reductase and Oxidative Damage in Therapeutic Options. *The Endocrine Society*, 26(3), 380–392. <https://doi.org/10.1210/er.2004-0028>

Suri, A. A. L. (2017). Hubungan Lama Menderita Diabetes Melitus Tipe 2 Dengan Kejadian Peripheral Arterial Disease (PAD) Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2.

Suyono, S., & W. (2010). Scanned by CamScanner. In *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam* (pp. 1873–1928).

Wahyuni, A., & Arisfa, N. (2016). Senam Kaki Diabetik Efektif Meningkatkan Ankle Brachial Index Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Ipteks Terapan*, 2, 155–164. <https://doi.org/10.22216/jit.2016.v10i2.440>

Waspadji, S. (2009). Scanned by CamScanner. In *Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu* (p. 31).

