

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden yang memiliki riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya yaitu 67 orang (49,6%).
2. Sebagian besar yang mengalami preeklampsia di kehamilan berikutnya yaitu 97 orang (71,9%)
3. Ada hubungan riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya dengan kejadian preeklampsia pada kehamilan berikutnya di Poli Klinik Kebidanan RSUD Wangaya dengan $p = 0,011$ dan nilai $OR = 0,338$ yang artinya ibu hamil yang mempunyai riwayat preeklampsia berisiko 0,3 kali lipat mengalami preeklampsia pada kehamilan berikutnya, dari pada ibu hamil yang tidak mempunyai riwayat preeklampsia.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Petugas Kesehatan

Diharapkan kepada petugas kesehatan agar mengoptimalkan penyuluhan dan pemeriksaan ANC kepada ibu hamil yang memiliki riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya sehingga dapat mencegah risiko terkena preeklampsia pada kehamilan berikutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai preeklampsia dengan menggunakan variabel diabetes melitus.