


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dari penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1.

Hubungan Konsumsi Garam Beriodium Pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian *Stunting*

Penjelasan :

Kejadian stunting pada anak dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya yaitu konsumsi garam beriodium ibu pada saat hamil dan pemberian ASI Eksklusif pada anak. Pada penelitian ini kedua factor ini akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Hubungan konsumsi garam beriodium ibu, pemberian ASI Eksklusif dan kejadian *Stunting* pada balita usia 24 – 59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Marga I

B. Variabel dan definisi operasional variabel

1. Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu variabel bebas dan variabel terikat

a. Variabel Bebas

- Konsumsi garam beriodium Ibu
- Pemberian ASI Eksklusif

b. Variabel Terikat

- Kejadian *Stunting* pada anak usia 24- 59 bulan.

2. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
1	Konsumsi Garam beriodium Ibu	Jumlah rata-rata konsumsi garam beriodium ibu perhari	Kuesioner	wawancara	Jumlah rata-rata konsumsi garam beriodium dalam gramkategorisasi Baik \geq 6-10 gr per hari Kurang $<$ 6 gr per hari	Interval
2.	Pemberian ASI Eklusif	Kegiatan ibu dalam pemberian ASI pada bayinya mulai saat kelahiran hingga usia 6 bulan tanpa diberi makanan/minuman tambahan	Kuesioner	wawancara	Ibu memberikan ASI Eksklusif dan Ibu yang tidak memberikan ASI	Ordinal

					Eksklusif	
	Kejadian <i>Stunting</i> Pada Anak Usia 24 – 59 Bulan	Suatu kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada anak usia 24 – 59 Bulan ditentukan metode antropometri berdasarkan indicator tinggi badan menurut umur (TB/U)	Mikrotoa	Pegukutan TB dan Umur	Z-Score Sangat pendek (< -3,0 SD) Pendek (-3,0 SD s/d < -2,0 SD) Normal (-2 SD s/d 2 SD)	Ordinal

C. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah

1. Ada hubungan antara konsumsi garam beriodium ibu dengan kejadian *Stunting* pada anak usia 24-59 bulan
2. Ada hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian *Stunting* pada anak usia 24-59 bulan