


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Keterangan :

Diteliti :

Tidak diteliti :

Gambar 2 Kerangka Konsep

Penjelasan :

Kebiasaan mengkonsumsi alkohol yaitu dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Faktor – faktor risiko peningkatan kadar SGPT yaitu umur, frekuensi konsumsi minuman beralkohol, jangka waktu konsumsi minuman beralkohol, volume konsumsi minuman beralkohol, jenis minuman beralkohol yang dikonsumsi. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mengetahui gangguan fungsi hati sangat penting sebagai indikator penyakit hati antara lain pemeriksaan bilirubin, ALP/GGT, SGOT, SGPT, albumin, globulin,. Salah satu parameter pemeriksaan fungsi hati yaitu pemeriksaan SGPT. Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan SGPT, dimana interpretasi dari pemeriksaan SGPT yaitu normal dan tinggi.

B. Variabel dan Definisi Oprasional Variabel

1. Variabel penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu kadar *Serum Glutamic Pyruvate Transaminase* pada peminum minuman beralkohol.

2. Definisi operasional

Tabel 1.

Definisi Oprasional

Variabel 1	Definisi Oprasional 2	Cara Pengukuran 3	Skala
			4
Umur	Peminum minuman	Data sekunder/studi	Interval
peminum	beralkohol dengan kategori	literature	
alkohol	umur :		
	19 - 28 tahun		
	29 - 38 tahun		

	39 - 48 tahun		
	49 - 58 tahun		
	59 – 68 tahun		
	69 – 78 tahun		
Frekuensi konsumsi alkohol	Frekuensi konsumsi minuman beralkohol dengan kategori:	Data sekunder/studi literature	Ordinal
	1 kali seminggu		
	2 kali seminggu		
	3 kali seminggu		
	4 kali seminggu		
	5 kali seminggu		
	6 kali seminggu		
	7 kali seminggu		
Jangka waktu konsumsi minuman beralkohol	Jangka waktu responden mulai mengonsumsi minuman beralkohol. Dengan kategori :	Data sekunder/studi literature	Interval
	1 -5 tahun		
	6 – 10 tahun		
	11- 15 tahun		
	>15 tahun		
Volume konsumsi minuman beralkohol	Volume responden konsmsi minuman beralkohol. Dengan kategori :	Data sekunder/studi literature	Ordinal
	1 Liter		
	1,5 liter		
	2 liter		

Jenis minuman	Jenis minuman	Data sekunder/studi	Ordinal
Beralkohol	beralkohol	literatur	
yang	dengan kategori:		
dikonsumsi	Bir		
	Tuak		
	Arak		
Kadar SGPT	Kadar enzim yang diukur dari serum peminum alkohol. Dimana merupakan enzim yang utama banyak ditemukan pada sel hati yang efektif dalam mendiagnosis fungsi hati.	Data sekunder (metode spektrofotometri)	Ordinal Nilai normal: <40 U/l Nilai tinggi: >40 U/l
