BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden terinfeksi COVID-19 yang dirawat di Ruang Jepun sebanyak 45 orang paling banyak berumur 50-59 tahun sebesar 26,7%, dan jenis kelamin yang terinfeksi COVID-19 didominasi oleh laki-laki sebesar 53,3%.
2. Nilai Saturasi Oksigen responden sebelum diberikan perawatan dari 45 responden, rata-rata 92,22% dengan standar deviasi adalah 2,15 dengan kategori hipoksia yang dialami responden adalah hipoksia ringan hingga sedang sebesar 80%.
3. Nilai Saturasi Oksigen responden pada saat Evaluasi Hari pertama perawatan dari 45 responden, rata-rata saturasi oksigen yang dialami responden saat evaluasi hari pertama perawatan adalah 97,49% dengan standar deviasi adalah 1,42 dengan kategori hipoksia yang dialami seluruh responden adalah kategori normal.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diungkapkan pada pembahasan dan hasil penelitian, ditemukan 80% responden masuk rumah sakit dengan kategori hipoksia ringan hingga sedang, maka disarankan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kepada pasien COVID-19 agar selalu waspada dengan penurunan saturasi oksigen. Kemudian keberhasilan peningkatan saturasi oksigen

yang cukup baik hingga mencapai kategori normal sehingga peneliti menyarankan peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait pengaruh beberapa tindakan penatalaksanaan mandiri perawat dalam menangani pasien COVID-19 seperti pengaruh pemberian posisi Pronasi (*Awake Prone* Position) sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dan dapat diterapkan dalam menjalankan fungsi perawat yaitu fungsi Independen.