

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Ruang Hemodialisa RSUD Klungkung terhadap 58 pasien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan hipervolemia, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik responden paling banyak memiliki rentang usia 51-60 tahun dengan persentase (34,5%), diikuti mayoritas pasien jenis kelamin laki-laki sebesar (67,2%), tingkat pendidikan SD terbanyak dengan persentase (32,8%), dan status tidak bekerja terbanyak dari status bekerja sebesar (51,7%).
2. Gambaran tanda mayor dan minor hipervolemia pada pasien gagal ginjal kronis tidak semua pasien ditemukan tanda mayor edema anasarca dan edema perifer hanya sebanyak (98,3%) dan pada tanda minor Hb/Ht turun hanya sebanyak (98,3%).
3. Gambaran gejala mayor hipervolemia pada pasien gagal ginjal kronis tidak semua pasien ditemukan gejala mayor ortopnea dan dispnea hanya sebanyak (98,3%).

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diungkapkan pada pembahasan dan hasil penelitian, peneliti menemukan hanya 57% data mayor yang terdokumentasikan dan sebanyak 43% data tidak terdokumentasikan. Oleh sebab itu maka pada perawat pelaksana meningkatkan proses diagnosis keperawatan hipervolemia sesuai dengan acuan pada buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) dengan melakukan pengkajian yang lebih komprehensif untuk mendukung dalam

penegakan diagnosis keperawatan hipervolemia pada pasien gagal ginjal kronis dan tidak lupa mendokumentasikannya di dalam rekam medis pasien.