

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar dukungan suami yang dimiliki wanita usia subur di UPTD Puskesmas Kediri II Tabanan adalah dukungan suami tinggi sebanyak 83 orang responden (63,9 %) yang dibuktikan dengan sebagian besar suami responden memberikan dukungan instrumental dan dukungan informasi kepada istrinya.
2. Pencegahan sekunder kanker serviks pada wanita usia subur terbanyak yaitu dalam kategori ya yaitu sudah melakukan pencegahan sekunder sebanyak 63 orang dengan persentase (48,5%) yang dipengaruhi oleh pendidikan responden sebagian besar berpendidikan perguruan tinggi dan bekerja sebagai karyawan swasta.
3. Hasil *uji chi square* didapatkan p value = 0,000 ($p < 0,05$) dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan dukungan suami dengan pencegahan sekunder kanker serviks pada wanita usia subur di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kediri II Tabanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kelemahan penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kediri

II Tabanan

Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pencegahan sekunder kanker serviks dengan IVA ataupun pap smear untuk mendeteksi dini kanker serviks sekaligus menjaga kesehatan reproduksi.

2. Kepada Kepala Puskesmas Kediri II Tabanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Puskesmas Kediri II Tabanan untuk menyelenggarakan penyuluhan berupa edukasi mengenai pentingnya melakukan pencegahan sekunder kanker serviks baik dengan IVA ataupun pap smear guna mencegah dan mendeteksi dini kanker serviks secara menyeluruh.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat menambah variabel yang bisa diteliti bersamaan variabel pencegahan sekunder kanker serviks seperti misalnya akses informasi dan keterjangkauan jarak pelayanan. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti tentang pencegahan primer seperti vaksinasi HPV dikarenakan pencegahan primer memerlukan dukungan suami yang tidak diteliti dalam penelitian ini serta pengkategorian usia responden yaitu wanita usia subur sebaiknya 15-49

tahun dan saat melakukan penelitian sebaiknya memperlihatkan hasil pemeriksaan iva ataupun pap smear agar lebih akurat