



BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Konsep



Keterangan:



= Variabel yang diteliti



= Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2 Kerangka Konsep

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. *Independent Variable* atau variabel bebas yaitu pemberian

ASI eksklusif dan riwayat penyakit infeksi

b. *Dependent Variable* atau variabel terikat yaitu *stunting*

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Instrumen dan Cara Pengukuran	Hasil Ukur	Skala Data
<i>Stunting</i>	Keadaan gizi balita usia 24 – 59 bulan yang ditentukan berdasarkan indek TB/U dengan Z- Score (-3) SD sampai dengan < (-2) SD dan < (-3) SD	Kuesioner Pengambilan data register Puskesmas dan buku KIA	1: <i>Stunting</i> : Z-Score (-3) SD sampai dengan < (-2) SD dan < (-3) SD 2: Tidak <i>Stunting</i> : Z-Score $\geq$ (-2) SD sampai dengan 2 SD	Nominal
ASI Eksklusif	Pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat atau vitamin berdasarkan pengakuan ibu balita	Kuesioner Wawancara kepada responden	1: Ya ASI Eksklusif 2: Tidak ASI Eksklusif	Nominal
Penyakit Infeksi	Suatu kondisi balita mengalami diare atau ISPA (infeksi pernapasan akut) yang pernah diderita.	Kuesioner Wawancara kepada responden	1: Ya: pernah menderita ISPA atau diare dengan durasi sakit	Nominal

ISPA: gejala panas diikuti satu atau lebih gejala lainnya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokkan.

Diare: dengan gejala buang air besar ≥ 3 kali sehari dengan konsistensi lembek atau cair dengan atau tanpa muntah.

> 3 hari dan frekuensi sakit > 3 kali dalam 6 bulan terakhir.
2: Tidak: tidak pernah menderita ISPA atau diare dan pernah mengalami diare atau ISPA dengan durasi sakit ≤ 3 hari dan frekuensi sakit ≤ 3 kali dalam 6 bulan terakhir.

C. Hipotesis

1. Terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* pada balita.
2. Terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian *stunting* pada balita.